

个)、宁夏(泾源六盘山, 1955, 1个)、新疆(库尔勒, 1000m, 1958.VII.10-VIII.17, 2个; 塔什, 4600m, 1987.VII.5, 1个; 吐鲁番, 20-140m, 1958.VI.29, 1个; 和靖, 950-1130m, 1958.VI.29, 1个; 策勒, 2350-3650m, 1988.VI.27, 1个)。

分布 北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、台湾; 原苏联, 蒙古国, 日本; 亚洲, 欧洲, 北非。

(119) 黄斑优食蚜蝇 *Eupeodes flaviceps* (Rondani, 1875)

Syrphus flaviceps Rondani, 1875: 133.

Syrphus braueri Egger, 1858: 714.

Metasyrphus flaviceps (Rondani, 1875): Peck, 1988: 33.

体长 10mm。

雄性 头顶三角黑色, 被黑色毛; 额黄色, 毛黑色; 颜黄色, 毛同色, 口缘及中突褐色; 颊具黑斑; 后头黑色, 覆黑色粉被和黄白色毛。复眼裸。触角红黄色, 第3节上侧色暗; 芒短, 与触角同色。中胸背板黑色, 具暗金绿色光泽, 两侧缘黄色, 密覆淡黄色毛; 小盾片黄色, 具黄色长毛; 侧板黑色, 黄白色毛长。腹部黑色, 具红黄色大斑; 第1节具金绿色光泽; 第2节中部具1对大的近三角形黄色侧斑, 斑前侧角达背板侧缘, 内角圆, 两斑相距较远; 第3节近前缘具1对大的近半圆形黄斑, 该斑大于背板2/3长, 斑前缘直, 两斑较靠近; 第4节具与第3节相似的斑, 但两斑更靠近, 且更近背板前缘, 第4节后缘黄色狭; 第5节黄色, 具黑色中斑。足红黄色, 基节和转节黑色。翅透明。腋瓣黄白色。平衡棒橙色。

共检查4号标本:

新疆(皮山布琼, 2600m, 1988.VI.17, 1个; 托克逊, 76m, 1958.VI.16, 2个; 若羌, 950m, 1960.V.5, 1个)。

分布 西藏、新疆; 原苏联; 欧洲。

(120) 宽条优食蚜蝇 *Eupeodes latifasciatus* (Macquart, 1829) (图85, 图版III: 6)

Syrphus latifasciatus Macquart, 1829: 242.

Syrphus affinis Loew, 1840: 574.

Scaeva abbreviatus Zetterstedt, 1849: 3136.

Syrphus affinis Palma, 1863: 52.

Syrphus submaculatus Frey, 1918: 13.

Metasyrphus chillcotii Fluke, 1952.