

被黑毛，两侧及后缘毛黄色。腹部第2节背板横置1对长形黄斑；第3、4节背板各具1宽度均匀的黄色横带，带之前缘两侧微凹，而后缘两侧略突出，前、后缘正中部均凹入很浅，前一条黄带的宽度略小于分隔两条黄带间黑带之宽度；第5节背板横置1略向下弯曲的黑横带，其两端接近背板侧缘；黄斑及黄带在其前侧角均超过背板侧缘。前、中足腿节基部1/3、后足腿节基部1/2黑色；跗节前端4个跗分节的背面黑色；前足腿节端部2/3处主要被黄毛，并混杂少量黑毛。翅瓣全部被毛。(摘自 He, 1992)

分布 黑龙江(哈尔滨)。

(135) 雅优食蚜蝇 *Eupeodes lepidi* He et Li, 1998 (图 100)

Eupeodes (Eupeodes) lepidi He et Li, 1998: 297-298.

体长 10.5mm。

雄性 头顶三角后缘覆淡黄色粉被；额角 85°；颜毛黄色，中条与口上缘深褐色。触角黄褐色；第3节椭圆形，腹缘深黄色。中胸背板黑色，具铜色光泽，被黄色长毛，翅后胛黄色；小盾片黄褐色，中域具黑长毛，周缘黄色毛长。腹部第2背板具1对横置的长三角形黄斑，第3、4背板各具1条波状黄横带，带之后缘中部深凹，前缘两侧及中部微凹，前一条黄带的宽度稍胜于分隔两条黄带间黑带的宽度；第5背板具1近似三角形黑斑；所有黄斑及黄带在前侧角均超过背板侧缘。前、中足腿节基部1/3和后足腿节基部2/3黑色；前足全部跗节背面和中、后足跗节端部4节背面黑色；前足腿节端部2/3处长毛为黑色。微毛覆盖翅膜的大部分。翅瓣全部被毛。(摘自 He & Li, 1998)

分布 宁夏(盐池)。




图 100 雅优食蚜蝇 *Eupeodes lepidi* He et Li (仿 He & Li, 1998) ♂

a. 头部 (后侧面观, 示眼后眶) (head in posterolateral view, showing postocular orbit) b. 翅 (示微毛的分布) (wing, showing distribution of microtrichia) c. 腹部 (背面观, 示黄斑和带) (abdomen in dorsal view, showing the yellow spots and bands) d. 雄性下生殖板 (腹面观) (hypandrium in ventral view) e. 阳茎 (aedeagus) f. 上叶 (superior lobe)