

(137) 青优食蚜蝇 *Eupeodes qingchengshanensis* He, 1990 (图 102)

*Eupeodes (Eupeodes) qingchengshanensis* He, 1990: 273-274.

体长 11.5mm, 翅长 10.5mm。

雄性 头顶三角区狭长；额角多为 90°左右，额淡黄褐色，触角上方无斑点或呈褐色；颜下方无黑毛，中条短，淡褐至深褐色，口缘淡褐到黑褐色。触角第3节椭圆形，上缘褐色，下缘黄褐色，长不及宽的2倍。中胸背板黑色，有金属光泽，两侧具界限模糊的淡黄褐色粉条纹；小盾片中域被黑毛，周缘被黄毛。腹部第2背板具黄斑1对，略呈三角形，横置；第3、4背板上各有1条黄色横带，带之前缘正中两侧略呈弧形凹入，后缘正中凹入较深，前一条黄带较宽，其宽度大于分隔两黄带之间黑带的宽度，后1条黄带较接近背板前缘，第4背板后缘有1狭黄带；第5背板中央有1略呈棱形黑斑，两侧及后缘黄色；第2-4背板黄斑及黄带的前侧角均超过各背板侧缘。前、中足腿节基部1/3、后足腿节基部3/5黑色；各足除基跗节色泽稍淡外，跗节背面呈黑褐色；前足腿节端部2/3处具长毛，全部或绝大部分为黑色。微毛复盖翅膜的大部分。翅瓣全部被毛。(摘自 He, 1990)




图 102 青优食蚜蝇 *Eupeodes qingchengshanensis* He (仿 He, 1990) ♂

- a. 头部正面 (左侧面观) (head in frontal view, lateral of left) b. 头部 (侧面观) (lateral view of head) c. 头部 (后侧面观) (posterohead in lateral view showing postocular orbit) d. 头顶三角 (vertical triangular) e. 触角 (antenna) f. 翅 (示微毛分布) (wing, showing distribution of microtrichia) g. 腹部 (背面观) (dorsal view of abdomen) h. 外生殖器 (侧面观) (lateral view of genitilia) i. 雄性下生殖板 (腹面观) (ventral view of hypandrium) j. 阳茎 (aedeagus) k. 上叶 (superior lobe)

分布 四川(灌县青城山)。

(138) 林优食蚜蝇 *Eupeodes silvaticus* He, 1993 (图 103)

*Eupeodes (Eupeodes) silvaticus* He, 1993: 89-90.

体长 11.0mm, 翅长 9.0mm

雄性 头顶三角后缘覆白色粉被；额角 85°，在触角上方具褐色卵形斑；颜下方无黑毛，侧面观中突上下不对称，中条黑褐色。触角深褐色，下缘色较淡。小盾片被黑毛，在侧缘及后缘被黄毛。腹部第2节背板横置1对近似三角形黄斑，黄斑未达背板侧缘；第3、4节背板各具1条前侧角达背板侧缘的波状黄横带，带之后缘中部深凹，前缘在两侧较正中部凹入深，前1条黄带宽度大于分隔两条黄带间黑带的宽度，黄带前侧角达背板侧缘；第5节背板中部具1黑横带。前足腿节基部2/3、中足腿节基部2/5及后足腿节基部3/5黑色；跗节端部4节背面黑色；前足腿节端部2/3处长毛为黑色。翅染黄褐色。微毛覆盖翅膜的大部分，翅瓣全部被毛。(摘自 He, 1993)

分布 黑龙江(宁安县)。




图 103 林优食蚜蝇 *Eupeodes silvaticus* He (仿 He, 1993) ♂

a. 头部 (正面观) (head in frontal view) b. 头部 (侧面观) (head in lateral view) c. 头部 (后侧面观, 示眼后眶) (head in posterolateral view, showing postocular orbit) d. 翅 (部分, 示微毛分布) (part of wing, showing distribution of microtrichia) e. 腹部 (背面观, 示黄斑及黄带形状) (abdomen in dorsal view, showing the yellow spots and bands) f. 雄性下生殖板 (腹面观) (hypandrium in ventral view) g. 上叶 (superior lobe)