

棒黄色。

共检查 3 号标本：

广西(凭祥, 2300m, 1963.IV.11, 1 个)、云南(景谷, 930m, 1955.IV.23, 1 个; 西双版纳勐遮, 870m, 1958.IX.8, 1 个)。

分布 广西、云南; 东洋区。

(498) 端齿缺伪蚜蝇 *Graptomyza dentata* Kertész, 1914

Graptomyza dentata Kertész, 1914: 83; Knutson *et al.*, 1975: 333.

体长 8-9.5mm。

额亮黑色, 具粗黑点; 颜很长, 黄色, 黄色沿眼缘向上至额部, 具黑褐色宽中条, 毛黄色。复眼被白色短毛。触角黑褐色, 细, 线形, 第 3 节很延长, 其长度超过中突; 芒黄褐色, 端部暗色。中胸背板黑色, 具金属光泽, 肩胛黄色, 翅后胛黄褐色, 毛和鬃黄色; 背板毛沿中线形成 2 纵条; 侧板黑色, 肩胛下方具 1 黄色圆斑; 小盾片黑色, 侧缘和后缘褐黄色, 盘凹上半部黑色, 下半部褐黄色, 毛黄色。腹部密被刻点, 黑色, 略带红黄色; 第 1 节前缘和前角黄色; 第 2 节两侧具 1 黄色纵条, 该纵条延伸至第 3 节中部, 其上具 1 对很短的黄色横带, 有时横带不很明显, 第 2 节后缘至腹部末端具逐渐加宽的黄色中条。足黄色, 前足腿节和胫节变褐色, 跗节褐色; 中足腿节略呈褐色; 后足腿节和胫节大部分褐色; 毛黄色。翅无明显暗斑。

检查 1 号标本：

福建(崇安三港, 1991.IX.13, 1 个)。

分布 福建、台湾。

(499) 台湾缺伪蚜蝇 *Graptomyza formosana* Shiraki, 1930

Graptomyza formosana Shiraki, 1930: 234; Knutson *et al.*, 1975: 333.

体长 4-6.5mm。

雌性 头顶具黑中条; 额黄色, 具倒置的梯形暗褐斑, 该斑从单眼前缘至触角; 颜黄色, 中突不很明显, 具褐色中条和侧条, 前者狭于后者。触角褐色, 上半部和端部暗色, 第 3 节稍延长, 端部达颜隆起处; 芒基部淡黄色, 端部暗色具短微毛。中胸背板亮黑色, 具光泽, 肩胛黄色, 两侧缘黄色狭, 沿盾沟黄色横带宽, 后缘具 1 长方形黄斑, 并与黄色侧缘相接; 背板具由金黄色毛形成的中条, 鬃黑色; 侧板亮黑色, 毛黄色, 前胸侧板具 1 较大黄斑; 小盾片黑色, 后缘和下部污黄色, 盘面毛灰白色, 鬃黑色。腹部黄色, 末端淡红黄色及黑色; 第 2 节后缘具黑色横带, 带两侧斜切, 前缘形成 3 个拱形