

棒黄色。

共检查 3 号标本：

广西(凭祥, 2300m, 1963.IV.11, 1 个)、云南(景谷, 930m, 1955.IV.23, 1 个; 西双版纳勐遮, 870m, 1958.IX.8, 1 个)。

分布 广西、云南; 东洋区。

**(498) 端齿缺伪蚜蝇 *Graptomyza dentata* Kertész, 1914**

*Graptomyza dentata* Kertész, 1914: 83; Knutson *et al.*, 1975: 333.

体长 8-9.5mm。

额亮黑色, 具粗黑点; 颜很长, 黄色, 黄色沿眼缘向上至额部, 具黑褐色宽中条, 毛黄色。复眼被白色短毛。触角黑褐色, 细, 线形, 第 3 节很延长, 其长度超过中突; 芒黄褐色, 端部暗色。中胸背板黑色, 具金属光泽, 肩胛黄色, 翅后胛黄褐色, 毛和鬃黄色; 背板毛沿中线形成 2 纵条; 侧板黑色, 肩胛下方具 1 黄色圆斑; 小盾片黑色, 侧缘和后缘褐黄色, 盘凹上半部黑色, 下半部褐黄色, 毛黄色。腹部密被刻点, 黑色, 略带红黄色; 第 1 节前缘和前角黄色; 第 2 节两侧具 1 黄色纵条, 该纵条延伸至第 3 节中部, 其上具 1 对很短的黄色横带, 有时横带不很明显, 第 2 节后缘至腹部末端具逐渐加宽的黄色中条。足黄色, 前足腿节和胫节变褐色, 跗节褐色; 中足腿节略呈褐色; 后足腿节和胫节大部分褐色; 毛黄色。翅无明显暗斑。

检查 1 号标本:

福建(崇安三港, 1991.IX.13, 1 个)。

分布 福建、台湾。

**(499) 台湾缺伪蚜蝇 *Graptomyza formosana* Shiraki, 1930**

*Graptomyza formosana* Shiraki, 1930: 234; Knutson *et al.*, 1975: 333.

体长 4-6.5mm。

**雌性** 头顶具黑中条; 额黄色, 具倒置的梯形暗褐斑, 该斑从单眼前缘至触角; 颜黄色, 中突不很明显, 具褐色中条和侧条, 前者狭于后者。触角褐色, 上半部和端部暗色, 第 3 节稍延长, 端部达颜隆起处; 芒基部淡黄色, 端部暗色具短微毛。中胸背板亮黑色, 具光泽, 肩胛黄色, 两侧缘黄色狭, 沿盾沟黄色横带宽, 后缘具 1 长方形黄斑, 并与黄色侧缘相接; 背板具由金黄色毛形成的中条, 鬃黑色; 侧板亮黑色, 毛黄色, 前胸侧板具 1 较大黄斑; 小盾片黑色, 后缘和下部污黄色, 盘面毛灰白色, 鬃黑色。腹部黄色, 末端淡红黄色及黑色; 第 2 节后缘具黑色横带, 带两侧斜切, 前缘形成 3 个拱形

峰；第3节具2个半圆形黑斑，在中线处分离，上部具1黑色近四角形斑与其相连，该节侧缘黑色；第4节中部从前缘至后缘为黑色斑，其两侧有卵圆形斑，侧缘黑色。足全黄色，后足腿节端部变褐色，下侧和外侧暗色，后足胫节除基部外暗褐色，足毛同色。翅稍褐色，具4个小褐色斑，无暗带。

**雄性** 腹部仅第2节有1黑横带；第3节前缘中部有1明显的褐色小斑；第4节无斑，后半部有许多黑毛；生殖节红黄色；毛淡黄色。

共检查8号标本：

北京(北京农业大学, 1956.VIII.27, 1个)、浙江(庆元百山祖, 1100m, 1994.IV.20, 1个、天目山, 1937, 1个)、安徽(黄山, 1961.IX.10, 1个)、四川(峨眉山报国寺, 1957.V.3-VII.7, 3个)、贵州(湄潭, 1956.VIII.27, 1个)。

**分布** 北京、河北、浙江、安徽、四川、贵州、台湾。

### (500) 长喙缺伪蚜蝇 *Graptomyza longirostris* Wiedemann, 1820

*Graptomyza longirostris* Wiedemann, 1820: 16; Knutson *et al.*, 1975: 334.

**体长** 7-7.5mm。

头橘黄色，颜和额等宽，约为头宽的1/3；额黑色，仅两侧黄色；颜具黑中纵条和侧纵条，喙长，黑色。触角褐黄色，第3节上侧黑色；芒橘黄色，羽毛状。中胸背板橘黄色，具1大的近方形黑色斑，该斑有时达后缘，前缘短中条与黑斑相接，黄色侧缘沿盾沟狭而短延伸；侧板黑色，仅肩胛下方及中胸侧板上具1大的三角形黄斑；小盾片暗黄色，中部褐色，鬃黑色。腹部黄色，侧缘黑色，狭；腹背具4条等宽的黑纵条，中间两条紧靠近，纵条从第2节前缘至腹末，有时纵条在各节边缘中断，形成12个独立的斑；腹末侧缘具1对褐色小齿。足橘黄色，腿节和前足胫节中部宽褐色；后足胫节几乎整个褐色，跗节端部黑色。翅淡灰色，翅痣淡黄色，翅前缘从翅痣至翅端具小烟色斑。

共检查2号标本：

广西(龙州大青山, 360m, 1963.IV.23, 1个)、云南(小勐养, 810m, 1957.III.31, 1个)。

**分布** 广西、云南；缅甸，印度，爪哇，马来西亚，苏门答腊。

### (501) 龙栖山缺伪蚜蝇 *Graptomyza longqishanica* Huang *et* Cheng, 1995 (图 363)

*Graptomyza longqishanica* Huang *et* Cheng, 1995: 92-94.

**体长** 6-7mm。

**雄性** 头顶黑色；额黑色，具深刻点，两侧沿眼缘黄色，额宽为头宽的1/3；颜黄