

峰；第3节具2个半圆形黑斑，在中线处分离，上部具1黑色近四角形斑与其相连，该节侧缘黑色；第4节中部从前缘至后缘为黑色斑，其两侧有卵圆形斑，侧缘黑色。足全黄色，后足腿节端部变褐色，下侧和外侧暗色，后足胫节除基部外暗褐色，足毛同色。翅稍褐色，具4个小褐色斑，无暗带。

雄性 腹部仅第2节有1黑横带；第3节前缘中部有1明显的褐色小斑；第4节无斑，后半部有许多黑毛；生殖节红黄色；毛淡黄色。

共检查8号标本：

北京(北京农业大学, 1956.VIII.27, 1个)、浙江(庆元百山祖, 1100m, 1994.IV.20, 1个、天目山, 1937, 1个)、安徽(黄山, 1961.IX.10, 1个)、四川(峨眉山报国寺, 1957.V.3-VII.7, 3个)、贵州(湄潭, 1956.VIII.27, 1个)。

分布 北京、河北、浙江、安徽、四川、贵州、台湾。

(500) 长喙缺伪蚜蝇 *Graptomyza longirostris* Wiedemann, 1820

Graptomyza longirostris Wiedemann, 1820: 16; Knutson *et al.*, 1975: 334.

体长 7-7.5mm。

头橘黄色，颜和额等宽，约为头宽的1/3；额黑色，仅两侧黄色；颜具黑中纵条和侧纵条，喙长，黑色。触角褐黄色，第3节上侧黑色；芒橘黄色，羽毛状。中胸背板橘黄色，具1大的近方形黑色斑，该斑有时达后缘，前缘短中条与黑斑相接，黄色侧缘沿盾沟狭而短延伸；侧板黑色，仅肩胛下方及中胸侧板上具1大的三角形黄斑；小盾片暗黄色，中部褐色，鬃黑色。腹部黄色，侧缘黑色，狭；腹背具4条等宽的黑纵条，中间两条紧靠近，纵条从第2节前缘至腹末，有时纵条在各节边缘中断，形成12个独立的斑；腹末侧缘具1对褐色小齿。足橘黄色，腿节和前足胫节中部宽褐色；后足胫节几乎整个褐色，跗节端部黑色。翅淡灰色，翅痣淡黄色，翅前缘从翅痣至翅端具小烟色斑。

共检查2号标本：

广西(龙州大青山, 360m, 1963.IV.23, 1个)、云南(小勐养, 810m, 1957.III.31, 1个)。

分布 广西、云南；缅甸，印度，爪哇，马来西亚，苏门答腊。

(501) 龙栖山缺伪蚜蝇 *Graptomyza longqishanica* Huang *et* Cheng, 1995 (图 363)

Graptomyza longqishanica Huang *et* Cheng, 1995: 92-94.

体长 6-7mm。

雄性 头顶黑色；额黑色，具深刻点，两侧沿眼缘黄色，额宽为头宽的1/3；颜黄