

峰；第3节具2个半圆形黑斑，在中线处分离，上部具1黑色近四角形斑与其相连，该节侧缘黑色；第4节中部从前缘至后缘为黑色斑，其两侧有卵圆形斑，侧缘黑色。足全黄色，后足腿节端部变褐色，下侧和外侧暗色，后足胫节除基部外暗褐色，足毛同色。翅稍褐色，具4个小褐色斑，无暗带。

**雄性** 腹部仅第2节有1黑横带；第3节前缘中部有1明显的褐色小斑；第4节无斑，后半部有许多黑毛；生殖节红黄色；毛淡黄色。

共检查8号标本：

北京(北京农业大学, 1956.VIII.27, 1个)、浙江(庆元百山祖, 1100m, 1994.IV.20, 1个、天目山, 1937, 1个)、安徽(黄山, 1961.IX.10, 1个)、四川(峨眉山报国寺, 1957.V.3-VII.7, 3个)、贵州(湄潭, 1956.VIII.27, 1个)。

**分布** 北京、河北、浙江、安徽、四川、贵州、台湾。

### (500) 长喙缺伪蚜蝇 *Graptomyza longirostris* Wiedemann, 1820

*Graptomyza longirostris* Wiedemann, 1820: 16; Knutson *et al.*, 1975: 334.

**体长** 7-7.5mm。

头橘黄色，颜和额等宽，约为头宽的1/3；额黑色，仅两侧黄色；颜具黑中纵条和侧纵条，喙长，黑色。触角褐黄色，第3节上侧黑色；芒橘黄色，羽毛状。中胸背板橘黄色，具1大的近方形黑色斑，该斑有时达后缘，前缘短中条与黑斑相接，黄色侧缘沿盾沟狭而短延伸；侧板黑色，仅肩胛下方及中胸侧板上具1大的三角形黄斑；小盾片暗黄色，中部褐色，鬃黑色。腹部黄色，侧缘黑色，狭；腹背具4条等宽的黑纵条，中间两条紧靠近，纵条从第2节前缘至腹末，有时纵条在各节边缘中断，形成12个独立的斑；腹末侧缘具1对褐色小齿。足橘黄色，腿节和前足胫节中部宽褐色；后足胫节几乎整个褐色，跗节端部黑色。翅淡灰色，翅痣淡黄色，翅前缘从翅痣至翅端具小烟色斑。

共检查2号标本：

广西(龙州大青山, 360m, 1963.IV.23, 1个)、云南(小勐养, 810m, 1957.III.31, 1个)。

**分布** 广西、云南；缅甸，印度，爪哇，马来西亚，苏门答腊。

### (501) 龙栖山缺伪蚜蝇 *Graptomyza longqishanica* Huang *et* Cheng, 1995 (图 363)

*Graptomyza longqishanica* Huang *et* Cheng, 1995: 92-94.

**体长** 6-7mm。

**雄性** 头顶黑色；额黑色，具深刻点，两侧沿眼缘黄色，额宽为头宽的1/3；颜黄

色，下部明显延伸，中条纹不明显。复眼覆淡色毛。触角褐色，第3节很长，6倍于宽，其基部及下缘橘黄色；芒基部橘黄色，端部褐色。中胸背板黑色，肩胛及其内侧、盾沟末端、翅后胛为黄色，背板后缘中部褐色；侧板黑褐色，具2个黄斑，分别位于前胸和中胸前侧片后半部；小盾片黄色，盘凹圆，大而深，内毛褐色；胸部毛黄色，缘鬃黑色，小盾片缘鬃黄色。腹部很拱，末端圆，黄色，具大块黑斑，黑色侧缘宽；第1节后缘黑色，有时中间中断，两侧与黑色侧缘相接，第1、2节之间并具界限明显的刻点，其余各节界限不明显；第2节前缘褐色，两侧不达侧缘，并逐渐收缩，其后具1对近方形大黑斑，该斑占背板2/3长，斑前缘向内凹，并在中线处相连，两侧不达侧缘；第3节具与第2节相似的大黑斑，但前缘不相连；第4节前部具1对较小的近半圆形黑斑，前缘凹，外侧大而钝圆，内侧小而尖；腹部末端侧缘具1对黄色齿突。足大部分黄色，前、中足腿节端半部下侧具褐色斑；后足腿节近端部具明显褐环；各足胫节褐色，后足胫节端部外侧具不明显的黑褐色斑；足毛黄色。翅无斑，翅面黄色，微毛分布均匀，Rs脉上具褐色小鬃。




图 363 龙栖山缺伪蚜蝇 *Graptomyza longqishanica* Huang et Cheng

a. 头部 (前面观 ♀) (head in frontal view ♀) b. 头部 (侧面观) (head in lateral view) ♂ c. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view) ♂ d. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view) ♀ e. 雄性外生殖器 (腹面观) (male genitalia in ventral view) f. 雄性外生殖器 (侧面观) (male genitalia in lateral view) g. 阴茎 (aedeagus)

**雌性** 颜较短，下部延伸不明显。腹部黑斑比雄性大，几乎占整个背板，仅余下狭的黄色横线和纵线。

共检查 8 号标本：

福建(将乐龙栖山, 1100m, 1991.V.22, 8个)。

分布 福建(龙栖山)。

(502) 多鬃缺伪蚜蝇 *Graptomyza multiseta* Huang et Cheng, 1995 (图 364)

*Graptomyza multiseta* Huang et Cheng, 1995: 94.

体长 ♀ 6mm。

头部毛黄色, 较长; 头顶和额褐色, 额宽为头宽的 1/4, 额两侧各具半圆形黄斑; 颜在触角下凹陷深, 中突很明显, 喙长, 颜黄色, 中条黑褐色。复眼被白色毛。触角长不超过中突, 第3节长为宽的2倍, 红黄色, 上缘褐色; 芒基部红黄色, 端部褐色。中胸背板褐黑色, 肩胛及后缘中部黄色, 前缘和侧缘褐色, 背板被白色毛, 其侧缘和后缘具许多黑鬃; 侧板褐黑色, 被白色长毛, 前胸及中胸前侧片(盾沟之下)具2个褐斑; 小盾片黑褐色, 光亮, 盘凹圆, 小而深, 内毛黑褐色, 缘鬃黑色。腹部很拱, 末端圆, 黄褐色, 被白色毛; 第2节和第3节具从前缘至近后缘的黑褐色中斑, 第2节斑三角形, 其后缘向两侧扩展成横带, 第3节斑近方形; 第4节具从前缘至后缘为褐黑色中斑, 两侧具不达前缘的褐色斑, 3个斑在后缘相互融合, 后缘褐色。前、中足大部分黄褐色, 跗节褐色; 后足腿节除端部外黄褐色, 其余褐色; 足毛白色, 长; 后足膨大。翅无斑, 翅痣黄色。




图 364 多鬃缺伪蚜蝇 *Graptomyza multiseta* Huang et Cheng

a. 头部 (侧面观) (head in lateral view) ♀ b. 胸、腹部 (背面观) (thorax and abdomen in dorsal view)

检查 1 号标本: