

福建(将乐龙栖山, 1100m, 1991.V.22, 8个)。

分布 福建(龙栖山)。

(502) 多鬃缺伪蚜蝇 *Graptomyza multiseta* Huang et Cheng, 1995 (图 364)

Graptomyza multiseta Huang et Cheng, 1995: 94.

体长 ♀ 6mm。

头部毛黄色, 较长; 头顶和额褐色, 额宽为头宽的 1/4, 额两侧各具半圆形黄斑; 颜在触角下凹陷深, 中突很明显, 喙长, 颜黄色, 中条黑褐色。复眼被白色毛。触角长不超过中突, 第 3 节长为宽的 2 倍, 红黄色, 上缘褐色; 芒基部红黄色, 端部褐色。中胸背板褐黑色, 肩胛及后缘中部黄色, 前缘和侧缘褐色, 背板被白色毛, 其侧缘和后缘具许多黑鬃; 侧板褐黑色, 被白色长毛, 前胸及中胸前侧片(盾沟之下)具 2 个褐斑; 小盾片黑褐色, 光亮, 盘凹圆, 小而深, 内毛黑褐色, 缘鬃黑色。腹部很拱, 末端圆, 黄褐色, 被白色毛; 第 2 节和第 3 节具从前缘至近后缘的黑褐色中斑, 第 2 节斑三角形, 其后缘向两侧扩展成横带, 第 3 节斑近方形; 第 4 节具从前缘至后缘为褐黑色中斑, 两侧具不达前缘的褐色斑, 3 个斑在后缘相互融合, 后缘褐色。前、中足大部分黄褐色, 跗节褐色; 后足腿节除端部外黄褐色, 其余褐色; 足毛白色, 长; 后足膨大。翅无斑, 翅痣黄色。




图 364 多鬃缺伪蚜蝇 *Graptomyza multiseta* Huang et Cheng

a. 头部 (侧面观) (head in lateral view) ♀ b. 胸、腹部 (背面观) (thorax and abdomen in dorsal view)

检查 1 号标本:

浙江(天目山, 1936, 1 个)。

分布 浙江。

(503) 黑足缺伪蚜蝇 *Graptomyza nigripes* Brunetti, 1913 (图版 VII: 20)

Graptomyza nigripes Brunetti, 1913: 167 (as *ventralis* var.); Knutson *et al.*, 1975: 334.

体长 7-7.5mm。

雌性 额短, 淡黑色; 颜黄色或污黄色, 正中及两侧各具黑色中纵条和侧条。触角橘红色, 第3节很长。中胸背板亮黑色或暗青铜色, 被短而密的褐灰色毛, 两侧自肩胛至小盾沟黄色或棕黄色, 翅后胛稍带黄色, 沿背板后缘污黄色或棕色, 其上具1列黑鬃; 背侧片、翅基部上方、翅后胛各具3黑鬃; 小盾片边缘黄色, 正中具棕褐色至黑色圆形大斑, 盘凹被淡色短毛, 边缘具黑鬃和黄长毛; 侧板褐棕色, 肩胛下方及中侧片后半部黄色具黑鬃。腹部卵圆形, 腹背很拱起, 深黄色; 第1背板黄色, 两侧具基部宽、向后部逐渐变狭的黑色纵条; 第2背板后部具1半圆形大黑斑, 斑前端与背板前缘接近, 并向两侧扩展, 但不达背板侧缘及后缘; 第3、4节背板黑斑极大, 前、后缘及两侧以黄色狭带与背板分开, 黑斑正中亦以淡色纵条将斑一分为二; 腹部末端具1齿。足棕黄色; 前、中足腿节端部 1/3—1/2、后足腿节端部约 3/4 以及各足腿节棕褐色至黑褐色; 各足膝部淡色, 跗节褐棕色, 端部色暗。足毛白色, 后足跗节具黑毛。翅透明, 淡灰黄色, 翅痣暗褐色。

共检查 6 号标本:

广西(龙州大青山, 360m, 1963.VI.23-26, 3 个; 那坡, 440m, 1998.IV.7, 1 个)、云南(小勐养, 1952.X.28, 1 个; 西双版纳勐海, 1200-1600m, 1959.VIII.10, 1 个)。

分布 湖南、广西、四川、云南、西藏(墨脱); 印度, 马来西亚。

(504) 额斑缺伪蚜蝇 *Graptomyza nitobei* Shiraki, 1930 (图 365)

Graptomyza nitobei Shiraki, 1930: 238; Knutson *et al.*, 1975: 334.

体长 5mm。

雌性 头部毛白色; 头顶和额黑色, 额两侧具小黄斑; 颜黄色, 具宽的黑褐色中纵条和侧纵条。复眼毛白色, 短。触角黑褐色, 第3节下侧红褐色; 芒羽状, 黄褐色, 末端暗。中胸背板亮黑色, 肩胛及翅后胛黄色, 盾沟基部黄色不明显; 小盾片亮黑色, 盘凹宽而平, 占小盾片端部 2/3 大小, 内毛黑色; 侧板亮黑色, 盾沟下方具黄纵斑; 胸部被白色毛, 背板侧缘及小盾片后缘具黑鬃, 后缘无鬃。腹部第1节黄色, 后缘具1对黑斑, 远离侧缘, 中部间断狭; 第2节黄色, 具3个大的黑色纵斑, 侧斑从背板前缘至后