

浙江(天目山, 1936, 1 个)。

分布 浙江。

(503) 黑足缺伪蚜蝇 *Graptomyza nigripes* Brunetti, 1913 (图版 VII: 20)

Graptomyza nigripes Brunetti, 1913: 167 (as *ventralis* var.); Knutson *et al.*, 1975: 334.

体长 7-7.5mm。

雌性 额短, 淡黑色; 颜黄色或污黄色, 正中及两侧各具黑色中纵条和侧条。触角橘红色, 第3节很长。中胸背板亮黑色或暗青铜色, 被短而密的褐灰色毛, 两侧自肩胛至小盾沟黄色或棕黄色, 翅后胛稍带黄色, 沿背板后缘污黄色或棕色, 其上具1列黑鬃; 背侧片、翅基部上方、翅后胛各具3黑鬃; 小盾片边缘黄色, 正中具棕褐色至黑色圆形大斑, 盘凹被淡色短毛, 边缘具黑鬃和黄长毛; 侧板褐棕色, 肩胛下方及中侧片后半部黄色具黑鬃。腹部卵圆形, 腹背很拱起, 深黄色; 第1背板黄色, 两侧具基部宽、向后部逐渐变狭的黑色纵条; 第2背板后部具1半圆形大黑斑, 斑前端与背板前缘接近, 并向两侧扩展, 但不达背板侧缘及后缘; 第3、4节背板黑斑极大, 前、后缘及两侧以黄色狭带与背板分开, 黑斑正中亦以淡色纵条将斑一分为二; 腹部末端具1齿。足棕黄色; 前、中足腿节端部 1/3—1/2、后足腿节端部约 3/4 以及各足腿节棕褐色至黑褐色; 各足膝部淡色, 跗节褐棕色, 端部色暗。足毛白色, 后足跗节具黑毛。翅透明, 淡灰黄色, 翅痣暗褐色。

共检查6号标本:

广西(龙州大青山, 360m, 1963.VI.23-26, 3 个; 那坡, 440m, 1998.IV.7, 1 个)、云南(小勐养, 1952.X.28, 1 个; 西双版纳勐海, 1200-1600m, 1959.VIII.10, 1 个)。

分布 湖南、广西、四川、云南、西藏(墨脱); 印度, 马来西亚。

(504) 额斑缺伪蚜蝇 *Graptomyza nitobei* Shiraki, 1930 (图 365)

Graptomyza nitobei Shiraki, 1930: 238; Knutson *et al.*, 1975: 334.

体长 5mm。

雌性 头部毛白色; 头顶和额黑色, 额两侧具小黄斑; 颜黄色, 具宽的黑褐色中纵条和侧纵条。复眼毛白色, 短。触角黑褐色, 第3节下侧红褐色; 芒羽状, 黄褐色, 末端暗。中胸背板亮黑色, 肩胛及翅后胛黄色, 盾沟基部黄色不明显; 小盾片亮黑色, 盘凹宽而平, 占小盾片端部 2/3 大小, 内毛黑色; 侧板亮黑色, 盾沟下方具黄纵斑; 胸部被白色毛, 背板侧缘及小盾片后缘具黑鬃, 后缘无鬃。腹部第1节黄色, 后缘具1对黑斑, 远离侧缘, 中部间断狭; 第2节黄色, 具3个大的黑色纵斑, 侧斑从背板前缘至后

缘, 达背板侧缘, 中部宽, 中斑从前缘至后缘, 上窄下宽, 端部圆钝; 第3节红褐色, 具黑色侧斑与前节相连, 向下逐渐收缩, 中斑不明显, 位于背板基半部, 与前节中斑相连; 第4节红褐色, 黑色侧缘与前节相接, 并逐渐消失。足黄色, 腿节端半部和胫节(除前足和中足膝部外)黑色, 前足跗节黑褐色, 中、后足跗节黄褐色。翅痣褐色, 前缘室末端具小褐斑, S_c 室末端下方及 R_1 室末端具宽的褐色横带。

检查标本 外来鉴定标本, 无具体信息。

分布 西藏、台湾。




图 365 额斑缺伪蚜蝇 *Graptomyza nitobei* Shiraki (仿 Shiraki, 1930)

a. 头 (侧面观) (head in lateral view) b. 翅 (wing) c. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

(505) 钝斑缺伪蚜蝇 *Graptomyza obtusa* Kertész, 1914

Graptomyza obtusa Kertész, 1914: 77; Knutson *et al.*, 1975: 334.

体长 ♂ 5mm。

头顶和额黑褐色, 额中部两侧沿眼缘具黄色狭条; 颜淡黄色, 具褐色中纵条和侧纵条, 毛黄色, 中突毛黑褐色。复眼被白短毛。触角基部2节黄褐色, 第3节延长, 黑褐色, 下侧黄褐色; 芒羽毛状, 黄褐色, 端部深色。中胸背板黑色, 具光泽, 肩胛、盾沟、翅后胛及背板后缘黄色, 毛白色, 侧缘及后缘具黑色长鬃; 小盾片亮黑色, 盘凹大而平, 几乎占小盾片盘面绝大部分, 内毛黄褐色, 缘鬃黑色; 侧板亮黑色, 具2个黄斑, 分别位于肩胛和盾沟的正下方。腹部黄色; 第1节后缘具1对黑斑, 远离侧缘, 中部宽间断;