

第2节具大的黑色梯形斑，仅前、后缘狭黄色，斑前缘中央略呈波形凸出，两侧远离背板侧缘，黄色后缘中央呈三角形向黑斑切入2/3，使黑斑呈1对四边形，但两斑前缘相连；第3节具与前节相近的黑斑，但黄色三角形切入更深且较近斑前缘；第4节全黑色，黄色侧缘在第4节前缘终止；背板被毛白色。足黄色，仅后足腿节端部及后足胫节黑色。翅在前缘室末端具褐斑，在亚缘室末端和上外缘横脉处各具褐色横带，前者宽，后者狭。平衡棒基部黄色，端部红黄色。

检查5号标本：

福建(建阳黄坑桂林，270-590m，1960.IV.14，1个)、江西(南昌梅岭，1978.IV.18，1个)、云南(勐腊，800m，1981.IV.11，1个)；小勐养，950m，1957.V.5，1个)、西藏(亚东，2900m，1978.VIII.24，1个)。

分布 福建、江西、云南、西藏、台湾。

(506) 桔缘缺伪蚜蝇 *Graptomyza periaurantaca* Huang et Cheng, 1995 (图 366)

Graptomyza periaurantaca Huang et Cheng, 1995: 95.

体长 ♂5mm。

头部毛黄色；头顶和额黑褐色，具光泽，额宽为头宽的1/4-1/3；颜短，下部延伸不明显，喙短；中突明显；颜黄色，具褐色中条；颊黄褐色。复眼被黄色毛。触角第3节宽短，2倍长于宽，黄褐色，上半部黑色；芒黄褐色，端部深色。中胸背板亮黑色，具光泽，肩胛、翅后胛黄色，毛黄色，缘鬃黑色；侧板黑色，前胸和中胸前侧片后部具黄斑；小盾片小，近三角形，盘凹椭圆形，小而深，内毛黄色；小盾片端部具1对黑鬃。腹部背板黑褐色，侧缘及第4节后缘橘红色，界限不整齐；腹面黄色，具褐斑。足橘黄色；后足基节及各足跗节除基跗节外褐色；足毛黄色，跗节被黑毛。翅略呈黄色，翅面微毛均匀，翅端半部具3条褐横带。




图 366 桔缘缺伪蚜蝇 *Graptomyza periaurantaca* Huang et Cheng

a. 头部 (侧面观) (head in lateral view) ♀ b. 腹部 (侧面观) (abdomen in lateral view)

检查 1 号标本:

四川(峨眉山清音阁, 800-1000m, 1957.V.30, 1 个)。

分布 四川。

(507) 杨氏缺伪蚜蝇 *Graptomyza yangi* Huang et Cheng, 1995 (图 367)

Graptomyza yangi Huang et Cheng, 1995: 94.

体长 ♀7mm。




图 367 杨氏缺伪蚜蝇 *Graptomyza yangi* Huang et Cheng

a. 头部 (侧面观) (head in lateral view) ♀ b. 胸、腹部 (背面观) (thorax and abdomen in dorsal view) c. 雄性外生殖器 (腹面观) (male genitalia in ventral view) d. 雄性外生殖器 (侧面观) (male genitalia in lateral view) e. 阴茎 (aedeagus)

头部被毛黄色; 头顶和额黑色, 额两侧沿眼缘黄色, 额宽为头宽的 $1/4-1/3$; 颜黄色, 在触角下凹入深, 中突大而明显, 颜下部明显延长, 喙很长; 具明显的亮黑褐色中条和侧纵条。复眼毛淡色; 触角较长, 超过中突, 长为宽的 2.5 倍, 黑褐色, 第 3 节下缘黄褐色; 芒羽毛状, 黄褐色。中胸背板黑色, 肩胛、盾沟末端、翅后胛及背板后缘黄色, 背板毛黄色, 鬃黑色; 侧板黑色, 具 1 黄斑和 1 黄纵斑, 分别位于前胸和中胸前侧片, 后者与盾沟末端黄色相连; 小盾片黑色, 盘凹大而平, 几乎占整个小盾片, 盘内毛黄色。腹部不拱, 末端尖, 侧缘不厚; 腹部背板橘黄色, 第 2 节具宽的近梯形黑中斑, 斑距背板前缘约 $1/4$ 长, 距背板后缘很近, 但不达后缘, 斑两侧远离背板侧缘; 第 3 节具很宽的黑斑, 斑前缘中央向前扩展成峰形, 顶端达背板前缘, 两侧向后收缩, 不达背板侧缘,