

(396) 黑股条胸蚜蝇 *Helophilus affinis* Wahlberg, 1844 (图版 VI: 2)

Helophilus affinis Wahlberg, 1844: 64; Peck, 1988: 195.

Helophilus siebkei Verrall, 1901: 86.

Helophilus borealis Siebke, 1863: 156; Huang *et al.*, 1996: 187.

体长 13-15mm。

雄性 头顶和额黑色；额两侧近乎平行，前部毛黄色，后部黑色；颜正中黑色纵条达触角基部，颜两侧下部黑色宽，口缘黑色，除黑色部分裸露外，其余密覆棕黄色粉被及淡色毛；颊黑色，粉被灰色。触角黑色，第3节棕黑色；芒远较触角长。中胸背板黑色，具4条淡色纵条，正中2条达小盾沟，被黄棕色毛；小盾片棕黄色，除后缘具黄色长毛外，均为黑色短毛。腹部暗黑色；第1背板黑色，大部覆灰色粉被；第2背板两侧各具棕红色大斑，前缘黑色部分不达背板侧缘，后缘黑色部分较宽，黑中条将前、后缘相连呈“T”字形黑斑；第3背板近前缘具1对较狭的棕红色横斑，斑内端各具卵圆形灰黄色粉被斑，该斑正中分离；第4背板近前缘具1对灰黄色粉被横斑，两斑被正中灰色粉被斑分开，横斑外侧不达背板侧缘。足黑色，前足腿节端部及胫节基部2/3黄色，胫节端部棕褐色，跗节黄色或第3、4节色暗；中足腿节端部及胫节全部黄色，跗节基部2节棕色；后足腿节黑色，胫节基部黄色。

雌性 额在触角基部宽度略大于头宽的1/3，黑色，被黑毛，前半部密覆棕黄色粉被，前部两侧具棕黄毛。腹部第5背板具1对灰白色粉被斑

共检查33号标本：

内蒙古(东乌旗, 1971.VIII.24, 1个)、黑龙江(带岭, 390m, 1963.VIII.20, 2个; 伊春, 1970.VIII.20, 1个、852农场, 1961.IX.9, 1个)、吉林(Kao-lin-tze, 4个)、四川(红原, 3500-3600m, 1983.VIII.22-29, 9个; 若尔盖, 3450m, 1983.VIII.25, 5个; 德格, 3500m, 1983.VII.5, 1个; 康定, 3450m, 1982.IX.9, 1个)、西藏(芒康, 3800m, 1976.VI.20, 1个; 察雅, 3600m, 1976.VIII.24, 1个, 3200m, IX.16, 3个; 波密, 2700m, 1983.IX.23, 1个; 拉萨, 3660m, 1960.VI.2, 1个)、青海(玉树, 3750m, 1964.IV.2, 1个)。

分布 内蒙古、吉林、黑龙江、四川、西藏、青海; 原苏联, 蒙古国; 欧洲。

(397) 连斑条胸蚜蝇 *Helophilus continuus* Loew, 1854 (图 303)

Helophilus continuus Loew, 1854: 18; Peck, 1988: 196; Huang *et al.*, 1996: 187.

体长 11-13mm。

雄性 头部覆淡黄色粉被及黄毛；头顶单眼区周围覆棕黄色粉被及黑色毛；额前方

初二校