

的基部；颊褐色，被淡色粉被，无毛。触角暗褐色，第3节宽于长；芒裸，粗。中胸背板黑色被灰粉和淡色毛；肩胛和中胸背板侧缘毛长；小盾片黄褐色，毛长，淡褐色。侧板黑色，被灰色粉被和淡黄色长密毛。足暗褐色。前足腿节和中足腿节基半部黄褐色，端半部黑色，前、中足胫节和跗节暗褐色；后足腿节很粗，弯曲，背面具不规则的黑斑，端腹面具很多黑刺。

雌性 与雄性很相似，但前、中足腿节黄褐色，端半部背面褐色。腹部黑褐色；第1节两侧和基缘淡黄色，密被淡色毛；第2节具1对四方形淡黄色侧斑，该斑占据整个侧缘，在盘面中断，后缘红褐色；腹部被毛全为淡褐色。翅透明。(摘自 Chu and Li, 1995)

分布 江苏(南京)。

(403) 短枝条胸蚜蝇 *Helophilus frutetorum* (Fabricius, 1775)

Syrphus frutetorum Fabricius, 1775: 765.

Syrphus femoralis Fallén, 1817: 31.

Helophilus xanthopygus Loew, 1846: 149.

Helophilus (Parhelophilus) frutetorum (Fabricius, 1775): Peck, 1988: 198.

雄性 头顶及单眼三角区黑色；额和颜被黄色粉被及同色毛；颜中部具亮黑色中纵条，无毛，从口缘伸达触角基部。触角黄褐色；芒同色。中胸背板暗黑色，具4条明显纵带；背板和侧板被毛浅黄色；小盾片黄褐色，半透明，边缘黄褐色毛长，中域毛黑色。腹部暗黑色，有明显的黄斑；第2背板具1对大的三角形黄色侧斑，黑色“工”字纹不与后缘相接。第3背板黑色，“工”字纹亦不与后缘相接，第4背板有1对灰白色半月形斑。前、中足腿节基部1/3黑色，端部2/3黄色，胫节和跗节黄色，中足腿节腹缘有2排黑刺毛。后足腿节基部1/2黑色，端部1/2黄色，腹缘基部有许多长短不一黑刺毛，后足胫节及跗节黄色。(摘自 Li, 1993)

分布 新疆；欧洲；原苏联。

(404) 黄氏条胸蚜蝇 *Helophilus hwangi* Li, 1993 (图 308)

Helophilus (Helophilus) hwangi Li, 1993: 113-115.

体长 11.5mm。

雄性 头长2倍于宽；头顶黑色，被黄褐色粉被和浅黄色毛；额黑色，被金黄色粉被和浅黄色毛；颜黄色，被金黄色粉被及毛，中条黑色，从触角基部伸至口缘。触角黄褐色；芒基部1/4黄褐色，端3/4黑色，裸。中胸背板黑色，被灰白色毛，具2对灰白色粉被纵条，从前缘达小盾片，中间1对向后渐宽，但不相连，肩胛黄褐色，被同色毛；