

具4条浅黄色纵条纹，粗细均匀，从前缘基部伸至端部；背板及侧板被浅黄色长毛。腹部第2背板黄色侧斑大，后缘黑色横纹狭；第3背板黄色侧斑呈指状；第4背板具灰白色新月形斑纹。前、中足腿节基半部黑色，端半部黄色；胫节基部1/3黄褐色，端部2/3黑褐色；后足腿节黑色，仅端部与黄褐色环纹，后足胫节基部1/3黄褐色，端部2/3黑褐色。(摘自Li, 1993)

分布 新疆；蒙古国；欧洲，新北区。

#### (406) 线条胸蚜蝇 *Helophilus lineatus* (Fabricius, 1787)

*Rhingia lineata* Fabricius, 1787: 357.

*Musca femorata* Panzer, 1794: 24.

*Syrphus lineatus* Fallér, 1817: 31.

*Eurimyia rhingioidis* Bigot, 1883: XXI.

*Helophilus (Eurimyia) lineatus* (Fabricius, 1787): Peck, 1988: 195; Li, 1995: 33-35.

体长 9-10mm，翅长 6.5-7.5mm。

**雄性** 头顶黑色，被金黄色粉被和稀疏毛；额黑色，粉被和毛同头顶；颜黑色，被金黄色粉被和淡黄色毛，无中突和中条纹。复眼大。触角第3节黄褐色；芒裸，暗褐色。中胸背板黑色，具2条狭的灰色亚中纵条纹，该条纹从前胸到中胸背板后缘；小盾片暗黄色，被毛稀疏，黄褐色；侧板黑色，被灰色粉被，具淡黄色稀疏毛；后胸腹板毛稀疏，淡黄色。翅透明。足黑色；前、中足腿节顶端1/3黄褐色，前足胫节基半部及中足胫节黄褐色，前、中足跗节黄褐色；后足腿节基部1/4和端部1/4褐色，中部1/2黑色，后足胫节中部1/3黄褐色，其余黑色；足毛主要淡黄色。腹部黑色；第1节黑色，被薄的淡色粉被；第2节具1对三角形橙黄色侧斑，不达中部1/3黑色，黄色侧斑中角具1对圆形灰色粉被斑；第3节前侧角具1对卵形橙黄色斑，后侧角黄斑三角形，第3节中、后缘具3灰色粉被带；第4节具灰色粉被，中部黑色；第5节整个被灰色粉被。

**雌性** 腹部第2、3、4节具3对新月形带，该带在两侧为黄色，中部为灰色粉被；第2、3节后缘中部还具有三角形粉被斑。(摘自Li, 1995)

分布 云南(昆明)；欧洲；原苏联，蒙古国。

#### (407) 灰纹条胸蚜蝇 *Helophilus transfugus* (Linnaeus, 1785)

*Muscas transfugus* Linnaeus, 1785: 592.

*Helophilus (Helophilus) transfugus* (Linnaeus, 1785): Peck, 1988: 195; Li et He, 1992: 147; Li, 1993:

**雌性** 头顶宽约为头宽的 1/5；额黑色，覆灰白色粉被及黑色毛；颜覆灰白粉被及同色毛，中突亮黑色。触角黑色。胸部黑色，被黑色毛，具 4 条灰白色纵带；小盾片基半部黑色，端半部褐色，周缘具黄褐色长毛。腹部黑色；第 2 背板两侧灰白色，中央具 1 对近月形灰白色斑纹；第 3 背板两侧的灰白纹同中间 1 对棒状灰白色斑纹相接；第 4 背板具 4 条灰白色纹。前、中足除腿节和胫节关节处黄褐色外，余均黑色；后足腿节黑色，胫节中央约 1/3 红褐色。(摘自 Li, 1993)

**分布** 新疆；欧洲。

#### (408) 异色条胸蚜蝇 *Helophilus versicolor* (Fabricius, 1805)

*Syrphus versicolor* Fabricius, 1805: 233.

*Helophilus (Parhelophilus) versicolor* (Fabricius, 1805): Peck, 1988: 199; 1979: 74; Li, 1995: 36-38.

**体长** 9-11mm，翅长 7-9mm。

**雄性** 头顶黑色，被金黄色粉被，被毛主要黑色；额黄色，被黄色粉被，沿两侧具黄色毛；颜黄色，覆黄色粉被，两侧具毛，颜面下部和口缘褐色，中突不明显，无中条纹。触角橙色；芒褐色，裸。中胸背板黑色，具黄色纵粉条纹和密毛；小盾片暗黄色，两侧黑色，边缘毛黄色，中部混有黑色毛；侧板黑色，被灰色粉被和淡黄色毛。翅透明。足黄色；前、中足腿节基半部、后足腿节基部 4/5 黑色；足毛主要黄色。后足腿节腹侧具黑刺，中足胫节后侧具 2 排黑毛。腹部黑色；第 1 节具暗黄色斑；第 2 节具大的近长方形的橙黄色斑，该斑与橙黄色后缘相连，中部为“X”形黑斑；第 3 节具大的橙黄色斑，中部具与第 2 节相似的“X”形黑斑，中部具 3 个圆的或卵形淡黄色粉被斑；第 4 节全被淡黄色粉被，前缘中部具 1 黑色小三角，第 5 节全被淡黄色粉被；腹部被毛主要为淡黄色，第 3、4 节后缘毛黑色。(摘自 Li, 1995)

**分布** 新疆(乌鲁木齐)；欧洲；原苏联。

## 64. 盾边蚜蝇属 *Kertesziomyia* Shiraki, 1930

*Kertesziomyia* Shiraki, 1930: 151. **Type species:** *Eristalis violascens* Kertész, 1913.

**属征** 体大。头稍宽于胸或等于胸；额突短，从复眼中部生出；颜在额突下凹入，具明显的圆中突；复眼裸，雄眼接眼。触角短，着生在额突上；背芒长，着生在第 3 触角节基部。中胸背板近方形；小盾片很宽大，具宽边。腹部长约等于或短于头、胸之和，端部收缩，第 5 节背板小。足细长，后足腿节仅略加粗，后足胫节略弯曲。翅同 *Eristalis* 属， $R_1$  室封闭， $r_{4+5}$  深凹入  $R_5$  室。