

雌性 头顶宽约为头宽的 $1/5$ ；额黑色，覆灰白色粉被及黑色毛；颜覆灰白粉被及同色毛，中突亮黑色。触角黑色。胸部黑色，被黑色毛，具 4 条灰白色纵带；小盾片基半部黑色，端半部褐色，周缘具黄褐色长毛。腹部黑色；第 2 背板两侧灰白色，中央具 1 对近月形灰白色斑纹；第 3 背板两侧的灰白纹同中间 1 对棒状灰白色斑纹相接；第 4 背板具 4 条灰白色纹。前、中足除腿节和胫节关节处黄褐色外，余均黑色；后足腿节黑色，胫节中央约 $1/3$ 红褐色。(摘自 Li, 1993)

分布 新疆；欧洲。

(408) 异色条胸蚜蝇 *Helophilus versicolor* (Fabricius, 1805)

Syrphus versicolor Fabricius, 1805: 233.

Helophilus (*Parhelophilus*) *versicolor* (Fabricius, 1805): Peck, 1988: 199; 1979: 74; Li, 1995: 36-38.

体长 9-11mm，翅长 7-9mm。

雄性 头顶黑色，被金黄色粉被，被毛主要黑色；额黄色，被黄色粉被，沿两侧具黄色毛；颜黄色，覆黄色粉被，两侧具毛，颜面下部和口缘褐色，中突不明显，无中条纹。触角橙色；芒褐色，裸。中胸背板黑色，具黄色纵粉条纹和密毛；小盾片暗黄色，两侧黑色，边缘毛黄色，中部混有黑色毛；侧板黑色，被灰色粉被和淡黄色毛。翅透明。足黄色；前、中足腿节基半部、后足腿节基部 $4/5$ 黑色；足毛主要黄色。后足腿节腹侧具黑刺，中足胫节后侧具 2 排黑毛。腹部黑色；第 1 节具暗黄色斑；第 2 节具大的近长方形的橙黄色斑，该斑与橙黄色后缘相连，中部为“X”形黑斑；第 3 节具大的橙黄色斑，中部具与第 2 节相似的“X”形黑斑，中部具 3 个圆的或卵形淡黄色粉被斑；第 4 节全被淡黄色粉被，前缘中部具 1 黑色小三角，第 5 节全被淡色粉被；腹部被毛主要为淡黄色，第 3、4 节后缘毛黑色。(摘自 Li, 1995)

分布 新疆(乌鲁木齐)；欧洲；原苏联。

64. 盾边蚜蝇属 *Kertesziomyia* Shiraki, 1930

Kertesziomyia Shiraki, 1930: 151. **Type species:** *Eristalis violascens* Kertész, 1913.

属征 体大。头稍宽于胸或等于胸；额突短，从复眼中部生出；颜在额突下凹入，具明显的圆中突；复眼裸，雄眼接眼。触角短，着生在额突上；背芒长，着生在第 3 触角节基部。中胸背板近方形；小盾片很宽大，具宽边。腹部长约等于或短于头、胸之和，端部收缩，第 5 节背板小。足细长，后足腿节仅略加粗，后足胫节略弯曲。翅同 *Eristalis* 属， R_1 室封闭， r_{4+5} 深凹入 R_5 室。