

**(198) 华赫氏蚜蝇 *Heringia sinica* Cheng, Huang, Duan et Li, 1998 (图 140)**

*Heringia sinica* Cheng, Huang, Duan et Li, 1998: 420.

体长 6mm。

**雄性** 头黑色，具光泽；头顶被黑色竖长毛；额鼓胀，额和颜密被黑色长毛；颜下部略收缩，颜宽为头宽的 1/3-2/5，两侧平行；后头被白短毛。复眼密被黄褐色毛，两复眼连线，约与头顶三角等长。触角黑褐色，下侧黄色；背芒基生，黑褐色，基部 1/3 加粗。中胸背板黑色，略具光泽，被白色长毛；小盾片和侧板同背板，小盾片后缘混有黑色毛，盾下毛白色，中等密。腹部细长，黑褐色，被淡色细毛。足黑色，仅前足和中足膝部(后足膝部极窄)、前足基跗节及中足跗节基部 2 节黄褐色；后足基跗节膨大，足毛白色。翅透明，翅痣黄色，翅面具微毛，r-m 脉在中室中部之前，R<sub>5</sub> 室呈锐角。平衡棒黄色。

**雌性** 额中部被淡色毛，中部两侧具小的圆粉斑；颜密被白色长毛。腹部椭圆形，密被刻点和淡色短毛。

共检查 19 号标本：

吉林(长白山, 850m, 1996.VII.21, 17 个)、四川(峨眉山, 1957.IV.21, 1 个)、甘肃(宕昌, 1995.VIII.5, 1 个)。

分布 吉林、四川、甘肃。




图 140 华赫氏蚜蝇 *Heringia sinica* Cheng, Huang, Duan et Li (仿 Cheng et al. 1998)

a. 头部 (head) b. 雄性外生殖器 (male genitalia)

**(199) 短齿赫氏蚜蝇 *Heringia brevidens* (Egger, 1865) (图 141)**

*Cnemodon brevidens* Egger, 1865: 574.