

**属征** 体小至中等大小，细长。复眼裸；触角第3节2倍长于宽，圆锥状至顶端尖圆；芒略短于第3触角节。腹侧片上、下毛斑后部宽分离；后胸腹板裸。雌性后足转节腹面具细或中等粗的顶端尖的圆柱形突起。腹部细长，两侧平行或狭卵形，背面平，明显具边；雄性尾器大而突出。

**分布** 古北区，东洋区，非洲区，澳洲区。

本属全世界共4种。我国有描述的种类共2种。

### 种 检 索 表

雌性后足转节刺突短粗；雌性腹部第2背板黄横带间断……………短刺刺腿食蚜蝇 *I. scutellaris*  
 雌性后足转节刺突细长；雌性腹部第2背板黄横带不间断……………埃及刺腿食蚜蝇 *I. aegyptius*

#### (141) 埃及刺腿食蚜蝇 *Ischiodon aegyptius* (Wiedemann, 1830) (图 106)

*Syrphus aegyptius* Wiedemann, 1830: 133.

*Sphaerophoria annulipes* Macquart, 1842: 103.

*Syrphus felix* Walker, 1852: 229.

*Syrphus brachypterus* Thomson, 1869: 496.

*Ischiodon aegyptius* (Wiedemann, 1830): Peck, 1988: 23; Huang *et al.*, 1996: 144.

**体长** 7-9mm。

头顶具明显的黑色纵条；额具1近方形黑斑；颜黄色，正中具不明显黑色纵条。触角褐色，第3节侧面暗褐色。中胸背板亮黑色，两侧缘及小盾片黄色，背板毛黄色；小盾片被黑毛；侧板黑色，具明显黄斑。腹部亮黑色，第1背板大部分黄色，第2-4背板具黄色横带，第5背板具1对位于背板两侧的黄斑。足黄色，后足腿节端部黑色；后足胫节黄褐色，顶端暗褐色；各足跗节黑色；雄性后足转节腹面具细长的刺突。翅透明。

共检查30号标本：

北京(1952.VII.12, 1个, 1961.VIII.18, 1个)、江苏(上海, 1930.VIII.21, 1个, 1932.IX.2, 1个, 1947.VIII.16, 2个; Haichow, 1926.VII.28, 5个; 南京, 1918.IX.17, 1个)、浙江(1932.VIII.21, 1个; 杭州, 1942.VIII.26, 1个)、江西(牯岭, 1934.IX.22, 1个; 莲塘, 1955.XII.5, 1个)、山东(崂山, 1个)、湖北(巴东, 1400m, 1989.VIII.12, 1个)、湖南(慈利江垭林场, 1988.IX.24, 1个)、广东(1932.II.4-XI.21, 6个)、云南(西双版纳, 650-850m, 1957.III.17-29, 2个; 元江, 500m, 1957.V.15, 1个)、新疆(伊犁, 1957.VIII.4, 1个)。

**分布** 北京、江苏、浙江、江西、山东、湖北、湖南、广东、云南、新疆；叙利亚，埃及；非洲区。




图 106 埃及刺腿食蚜蝇 *Ischiodon aegyptius* (Wiedemann)  
后足 (hind leg)

(142) 短刺刺腿食蚜蝇 *Ischiodon scutellaris* (Fabricius, 1805) (图 107, 图版 II: 19)

*Scaeva scutellaris* Fabricius, 1805: 252.

*Syrphus ruficauda* Bigot, 1884: Synonymized by Thompson *et al.*, 1986: 444.

*Ischiodon trochanterica* Sack, 1913: 6.

*Melithreptus ogasawarensis* Matsumura, 1916: 23.

*Ischiodon boninensis* Matsumura, 1919: 128.

*Ischiodon scutellaris* (Fabricius, 1805): Knutson *et al.*, 1975: 315; Sun, 1978: 225; Peck, 1988: 23-24; He, 1992: 58; Huang, 1992: 1137; Huang *et al.*, 1996: 146.

体长 9-10mm。

**雄性** 头顶三角黑色；额与颜黄色，额正中具纵沟；颜光亮，两侧或多或少平行，下部稍狭，中突明显；颊极狭，黄色；后头覆白粉被及黄毛，下部毛白色。触角褐色，下侧黄色；芒略短于第3触角节，黄色，端部黑色。中胸背板亮黑色或蓝黑色，具光泽，两侧具黄或棕黄色宽纵条，自肩胛直达翅基部之后具黄毛；翅后胛棕色；背板毛棕色，两侧黄色毛长而密；小盾片黄至橘黄色，盘面中央常具棕色至棕褐色大斑和黄至棕色竖毛；侧板亮黑色，中侧片正中具大形黄白色纵斑，该斑与腹侧片的黄色卵形横斑相连，两斑具白毛。腹部蓝黑至亮黑色，具3条黄色横带；第1背板两侧各具小黄斑；第2背