

触角红黄色；芒长，裸，着生在第3节基部。中胸背板黑色，肩胛黄褐色，具3条黄色粉被横带，背板前缘横带最宽，盾沟处横带最狭，背板后缘横带中部向前扩展呈三角形或半圆形斑，背板中部具1对黄粉被纵条，纵条相距很近，背板两侧在翅基部上方及翅后胛黄褐色，覆黄色粉被，被黄色长鬃；小盾片黑褐色，具黄色色或黄褐色宽边，毛短；侧板黄色，中侧片前部具黑色中条。腹部红黄色或黄褐色，各节后缘具黄粉被横带；腹部黑色横带不明显，仅各节中部近前缘具不明显的暗斑。足红黄色或黄褐色，前足跗节褐色或黑褐色。翅透明，翅端部具不明显暗斑。

雌性 头顶和额黑褐色，额密覆黄粉被；额突裸，黄褐色；颜凹入，无中突。腹部第2-4节中部具宽的黑色或黑褐色横带或横斑，带前缘中部向前扩展成弧形，有时黑带正中很狭中断，第1节前缘中部黑褐色。

共检查20号标本：

四川(峨眉山, 1800-2000m, 1957.VIII.3-29, 19个；卧龙, 2500m, 1983.VIII.8, 1个)。

分布 四川。

我国有记载而未见标本的种类：

(472) 尖斜环蚜蝇 *Korinchia apicalis* Shiraki, 1930

Korinchia apicalis Shiraki, 1930: 157-159; Knutson *et al.*, 1975: 361.

Palumbia (Korinchia) apicalis (Shiraki, 1930): Thompson, 1975: 207.

体长 15mm。

雄性 头宽于胸；头顶很狭长，黑褐色；额短小，额突较突起，覆金黄色粉被；颜金黄色粉被直到黄褐色口缘，具中等宽的暗黄色侧条纹，裸，中突小。复眼铜色。触角红褐色；芒亮红褐色，很细，近2倍于触角长。中胸背板在翅基两侧黑色，覆褐色粉被和黑色毛，黄色前缘横带狭，在中部不明显，盾沟横带很狭，宽中断，后缘仅在中部具不明显的红褐色宽横带；侧缘毛长，黑毛，翅基部被少量红黄毛；小盾片黑色，后缘暗黄色，覆褐色粉被和黑毛；侧板黑褐色，覆灰黄色粉被和长黄毛，中侧片和腹侧片毛尤其长。腹部毛适当亮黑褐色；第1节后缘不明显，暗红褐色，两侧被淡色毛；第2节长于第1节，但后缘明显亮色，两侧毛很长；第3节相当宽，红褐色，后缘被金黄色毛和两侧密被同色毛；第4节具大的橙红色中斑纹，该斑纹到达后缘。后足被长、密黑毛。(摘自 Shiraki, 1930)

分布 中国台湾。

(473) 波斜环蚜蝇 *Korinchia potanini* Stackelberg, 1963

Korinchia potanini Stackelberg, 1963: 5.