

体长 12mm。

头顶黑色，毛黑褐色；额黑色；颜黄褐色，密覆同色粉被，中条和侧条宽，裸；后头黑色，中、下部密覆黄粉被和同色长毛。触角红褐色，第3节圆，略覆黄粉被；芒红黄色，覆微毛。中胸背板黑色，密被黑短毛和黄褐色较长毛及3条黄粉被横带，横带分别位于肩胛之间、盾沟及背板后缘，背板两侧后部鬃毛黄色，长；小盾片黑色，红黄边宽，被黄褐色较长毛，后缘毛长；侧板黑色，略覆黄粉被，毛黄褐色。腹部黑色，横带红黄色；第1节基部黑色，端部红黄色；第2节中部具1对宽的黑斑，斑的两侧不达背板侧缘，后缘红黄色较狭；第3节前缘红黄色狭，后缘红黄色宽，中部向前伸；第4节同第3节；第5节大部红黄色，仅前缘及两侧黑色；腹部毛短，基部毛黄色，端部黑色。足红黄色，前足胫节内侧及端部、前足跗节黑色。翅透明，翅端部淡褐色。

雌性 额中部及两侧密覆黄粉被。

共检查2号标本：

云南(云龙志奔山，2430m，1981.VI.24，1个；维西攀天阁，2920m，1981.VII.17，1个)。

分布 福建、云南、台湾。

(469) 黄缘斜环蚜蝇 *Korinchia nova* Hull, 1937 (图版 VII: 2)

Korinchia nova Hull, 1937: 175; Knutson *et al.*, 1975: 361.

体长 10-12mm。

雄性 头顶三角很长，黑色，毛黄褐色，靠后着生，单眼三角前密覆黄粉被；额黑色，两侧沿眼缘覆狭黄粉被；颜黄褐色，密覆黄白色粉被，中条和侧条裸，中突圆；后头黑色，密覆明显的黄粉被和同色毛。触角黄褐色；芒裸，长，黄褐色。中胸背板黑色，密被褐色粉被，背板前缘两肩胛之间及沿盾沟具黄粉被横带，盾沟横带中断，背板两侧翅基部上方及翅后胛鬃毛黄色，长，背板被黑短毛和黄长毛；小盾片褐黑色，基部黑色，后缘具黄边，毛长；侧板黑色，中侧片后部具黄色中条。腹部黑色，各节后缘黄色；第1节后缘黄色极狭；第2节两侧具1对黄侧斑，斑外侧占整个背板侧缘；第3、4节侧缘黄褐色或红褐色，黄色后缘横带暗。足黄色或黄褐色，前足胫、跗节黑褐色或黑色，后足腿节端部及胫节端部具较褐或黑褐色斑。

雌性 额中部黄褐色粉被横带宽，额突黑褐色，正中裸；雌性颜凹入。

共检查12号标本：

四川(卧龙，2500m，1983.VIII.8，2个、峨眉山，1750m，1979.VI.9，1个，1957.VII.2-VIII.29，5个；1100-1800，1955.VI.17-23，2个)、陕西(宁陕，1580m，1998.VII.27，1个；凤县，1580m，1973.VII.22，1个)。

分布 四川、陕西。

(470) 橘足斜环蚜蝇 *Korinchia rufa* Hervé-Bazin, 1922 (图 347, 图版 VII: 3)

Korinchia rufa Hervé-Bazin, 1922: 122; Knutson *et al.*, 1975: 361.

Palumbia (Korinchia) rufa (Hervé-Bazin, 1922): Thompson, 1975: 207.

体长 17mm。

头部橘红色，头顶三角长，单眼着生较后，毛红黄色；额和颜略覆淡色粉被，额突大，中突宽平，明显；后头黑色，毛灰黄色。触角橘红色。中胸背板黑色，覆红褐色粉被，后缘密覆黄粉被，肩胛、背板后部两侧及翅后胛红褐色；背板被黑短毛和黄褐色较长毛，两侧鬃毛红黄色，长；小盾片黑色，后缘具黄色宽边，毛黄色，长。腹部黑色，毛黄色，两侧毛长；第 1、2 节黑色，第 2 节后缘红黑色，中部略宽；第 3 节前缘呈拱形弯曲，基部及两侧黑色，其余红黑色；第 4 节仅前缘狭黑色。足橘红色，各足腿节基部或多或少色暗，前足跗节黑褐色。翅淡黄色，翅中部和近端部具 2 个小暗斑。

检查 1 号标本：

海南(水满，1879m，1960.V.26，1 号)。

本种为我国新记录种。

分布 海南；印度。




图 347 橘足斜环蚜蝇 *Palumbia rufa* Hervé-Bazin
翅 (wing)

(471) 红腹斜环蚜蝇 *Korinchia sinensis* Curran, 1929 (图版 VII: 4)

Korinchia sinensis Curran, 1929: 503.

Palumbia (Korinchia) sinensis (Curran, 1929): by Thompson, 1975: 207.

体长 10-12mm。

雄性 头顶三角长，黑褐色或黑色，单眼三角前密覆黄色粉被，单眼着生较后；额黄褐色，两侧沿眼缘密覆宽黄色粉被，额突正中裸，光亮；颜黄褐色，密覆黄色粉被，中突宽而平，正中条和侧条裸；后头狭，密覆黄白色粉被，中、下部被黄白色较长毛。