

触角红黄色；芒长，裸，着生在第3节基部。中胸背板黑色，肩胛黄褐色，具3条黄色粉被横带，背板前缘横带最宽，盾沟处横带最狭，背板后缘横带中部向前扩展呈三角形或半圆形斑，背板中部具1对黄粉被纵条，纵条相距很近，背板两侧在翅基部上方及翅后胛黄褐色，覆黄色粉被，被黄色长鬃；小盾片黑褐色，具黄色色或黄褐色宽边，毛短；侧板黄色，中侧片前部具黑色中条。腹部红黄色或黄褐色，各节后缘具黄粉被横带；腹部黑色横带不明显，仅各节中部近前缘具不明显的暗斑。足红黄色或黄褐色，前足跗节褐色或黑褐色。翅透明，翅端部具不明显暗斑。

雌性 头顶和额黑褐色，额密覆黄粉被；额突裸，黄褐色；颜凹入，无中突。腹部第2-4节中部具宽的黑色或黑褐色横带或横斑，带前缘中部向前扩展成弧形，有时黑带正中很狭中断，第1节前缘中部黑褐色。

共检查20号标本：

四川(峨眉山, 1800-2000m, 1957.VIII.3-29, 19个；卧龙, 2500m, 1983.VIII.8, 1个)。

分布 四川。

我国有记载而未见标本的种类：

(472) 尖斜环蚜蝇 *Korinchia apicalis* Shiraki, 1930

Korinchia apicalis Shiraki, 1930: 157-159; Knutson *et al.*, 1975: 361.

Palumbia (Korinchia) apicalis (Shiraki, 1930): Thompson, 1975: 207.

体长 15mm。

雄性 头宽于胸；头顶很狭长，黑褐色；额短小，额突较突起，覆金黄色粉被；颜金黄色粉被直到黄褐色口缘，具中等宽的暗黄色侧条纹，裸，中突小。复眼铜色。触角红褐色；芒亮红褐色，很细，近2倍于触角长。中胸背板在翅基两侧黑色，覆褐色粉被和黑色毛，黄色前缘横带狭，在中部不明显，盾沟横带很狭，宽中断，后缘仅在中部具不明显的红褐色宽横带；侧缘毛长，黑毛，翅基部被少量红黄毛；小盾片黑色，后缘暗黄色，覆褐色粉被和黑毛；侧板黑褐色，覆灰黄色粉被和长黄毛，中侧片和腹侧片毛尤其长。腹部毛适当亮黑褐色；第1节后缘不明显，暗红褐色，两侧被淡色毛；第2节长于第1节，但后缘明显亮色，两侧毛很长；第3节相当宽，红褐色，后缘被金黄色毛和两侧密被同色毛；第4节具大的橙红色中斑纹，该斑纹到达后缘。后足被长、密黑毛。(摘自 Shiraki, 1930)

分布 中国台湾。

(473) 波斜环蚜蝇 *Korinchia potanini* Stackelberg, 1963

Korinchia potanini Stackelberg, 1963: 5.

Palumbia (Korinchia) potanini (Stackelberg, 1963): Thompson, 1957: 207; Peck, 1988: 211.

颜面除中条纹亮黑色外，覆灰白色粉被。中胸背板和小盾片毛黄色并具灰黄色鬃。腹部整个黑色，第 2-4 背板具青铜色侧斑。

分布 四川。

78. 伪斜环蚜蝇属 *Pterallastes* Loew, 1863

Pterallastes Loew, 1863: 317. Type species: *Pterallastes thoracicus* Loew, 1863 (des. Osten Sacken, 1875: 64).

Pseudozetterstedtia Shiraki, 1930: 199. Type species: *Pseudozetterstedtia unicolor* Shiraki, 1930.

属征 头前面观三角形；复眼裸，雄性合眼。额突低，位于头中部；雄性颜具平而明显的中突，雌性颜凹；颊宽。触角短，第 3 节圆；背芒裸，长。中胸背板长大于宽；小盾片无明显盾下毛；后胸腹板裸。腹部卵圆形。足简单，后足腿节不膨大，腹面具刺。翅 R_1 室开放， r_{4+5} 脉深环凹入 R_5 室， $r-m$ 脉明显在中室中部之后。

分布 本属仅记载有 4 种，古北区 3 种，新北区 1 种。

我国有描述的种类共 2 种，其中 1 种有标本。

(474) 蜂伪斜环蚜蝇 *Pterallastes bomboides* Thompson, 1974 (图版 VII: 5)

Pterallastes bomboides Thompson, 1974: 22; Peck, 1988: 212.

体长 ♀ 10-11mm。

头黑色；头顶和额覆淡褐色粉被和黑色毛，额端部 1/3 黑色，光亮；颜无中突，覆灰白色粉被；后头覆灰白粉被和白毛。触角基部 2 节黄褐色，第 3 节橘黄色；芒同色。中胸背板黑色，中部密被黄色和黑色毛，盾沟处几乎全为黑色毛，两侧为粗的黄色长毛；小盾片密被粗的黄色长毛；侧板被白色至黄色长毛。腹部黑色，具光泽；第 1 节毛白色，第 2 节中部 1/3 毛黑色，短，两侧毛白色；第 3 节及其后各节毛黄红色，第 3 节两侧缘被毛白色，长。足黑色，腿节末端、胫节基部黄色，中、后足跗节橘黄色；足毛黄色至白色，仅后足腿节腹面毛黑色。翅透明。

检查 6 号标本：

四川(若尔盖，3450m，1983.VIII.31, 1 个；德格，3500m，1987.VII.5, 1 个)、西藏(察雅吉塘，3600m，1976.VII.8, 1 个；类乌齐，3750m，1976.VIII.16, 1 个)、青海(玉树布朗，3800m，1964.VIII.12, 2 个)。