

近端部具不明显的褐色暗斑。

雌性未知。

此种与印度种 *L. austeni* Brunetti 很相近，但后者腹部全黑色，腹部被毛基部黄色，中部黑色，端部红黄色。

正模 ♂，云南西双版纳孔明山，2000m，1957.IX.26，臧令超采。




图 334 亮毛长吻蚜蝇，新种 *Lycastris flavicrinis* Cheng, sp. nov.

a. 头部 (侧面观) (head in lateral view) b. 翅 (wing)

75. 硕木蚜蝇属 *Macrozelima* Stackelberg, 1930

Macrozelima Stackelberg, 1930: 229. Type species: *Zelima hervei* Shiraki, 1930 (as *Macrozelima bidentata* sp. nov.)

属征 体裸，被毛少，外形似蜂。颜无中突，口上缘突出。额突明显。触角短，芒裸。复眼裸。翅 r_{4+5} 脉直， $r-m$ 脉斜，位于中室中后部， R_1 室开放。足细长，后足腿节近端部具内外 2 齿。腹部细长，两侧平行。

本属为我国新记录属，仅 1 种。

(455) 赫尔硕木蚜蝇 *Macrozelima hervei* (Shiraki, 1930) (图 335)

Zelima hervei Shiraki, 1930: 86.

Macrozelima hervei (Shiraki, 1930): Peck, 1988: 209.

体长 18mm。

雌性 头胸等宽，头顶和额黄色，单眼三角黑褐色，额突黄褐色，光亮；颜黄色，覆同色粉被和短毛；后头和后颊黄色，具同色毛。触角短，黄褐色，第3节黄色；芒长，黄色。中胸背板黑色；肩胛大，黄色，其上覆白色粉被，两侧具宽的黄褐色纵条，该纵条从肩胛至背板后缘，中部具1对灰色粉被中纵条，该纵条不达背板后缘，近背板后缘具1心形黄褐斑；背板毛短，黄色；小盾片黄褐色，基部色暗，具2个不明显的黑斑，毛黄色，短；侧板黑褐色。腹部平，略具光泽，第2节最长；腹部基部3节黄色，第2、3节具黑色后缘横带，第3节具不明显的暗色中纵条；第4节和第5节黑色；腹部毛短，黑色，基部及两侧毛黄色。足细长，黄色；中、后足基节褐色，后足腿节端半部黑色，近端部下侧具内、外齿突；足毛短，黄色，后足腿节大部黑色。翅呈黄色，端部略带黑色，上外缘横脉与 r_{4+5} 脉相交成锐角。平衡棒黄色。

检查1号标本：

辽宁(桓仁, 1997.VII.6, 1000-1325m, 1个)。

本种为我国新记录种。

分布 辽宁；原苏联(远东)，日本。




图 335 赫尔硕木蚜蝇 *Macrozelima hervei* (Shiraki) ♂ (仿 Shiraki, 1930)

a. 头(侧面观)(head in lateral view) b. 腹部(背面观)(abdomen in dorsal view) c. 翅(wing) d. 后足(hind leg)

76. 迷蚜蝇属 *Milesia* Latreille, 1804

Milesia Latreille, 1804: 194. Type species: *Syrphus crabroniformis* Fabricius, 1775 (des. Williston, 1887: 254).