

检查 1 号标本：海南(尖峰岭, 1982.IV. 27, 1 个)。

本种为我国新记录种。

分布 海南、四川、云南；印度，泰国，爪哇，锡兰。

我国有记载而未见标本的种类：

(417) 腹毛管蚜蝇 *Mallota abdominalis* (Sack, 1927)

Tubifera abdominalis Sack, 1927: 314.

Paramesembrius abdominalis: Shiraki, 1930: 176-178.

Mallota abdominalis (Sack, 1927): Knutson *et al.*, 1975: 354.

体长 10-12mm。

雌性 头顶黑色，覆黑褐色粉被和毛；额亮黑色，上半部粉被褐色，具狭的黄色中线和小的银白色粉被侧斑；颜面覆白粉被和同色毛，黑色中条纹宽。触角暗褐色，第 3 节黄褐色，上缘黑色；芒黄褐色，顶端黑色。中胸背板黑色，覆黑褐色粉被，前半部被黄褐色毛，后半部被暗黑色毛，肩胛和翅后卵毛橙黄色；小盾片青铜色，基半部色暗，毛亮黄色；侧板黑色，覆灰粉被和白色毛，翅基部毛红褐色。腹部红黄色；第 1 节中部具大的黑色横斑；第 2 节前、后缘各具黑色横带；第 3 节近后缘黑横带宽，中部具圆的黑斑；腹背毛黄色，第 2 节黑色部分和几乎整个第 3 节表面被短黑毛，第 5 节和基部 2 节侧面毛长。足黑色，前足腿节顶端、胫节基半部及基跗节、后足腿节基部 1/3 和胫节基部黄色。翅暗色。腋瓣白黄色，边橙黄色，缘毛密，黄色；平衡棒亮橙黄色。

雄性 第 2 节黑横带狭，第 3、4 节横带不明显；第 4 节横带较宽，且具近三角形黑色中斑。后足胫节和跗节全黑色，毛黄色，腿节上侧毛长；后足胫节下缘毛稀少，长，淡色，并具许多短毛；中足腿节下缘具一些细鬃。(摘译自 Shiraki, 1930)

分布 中国台湾；日本。

(418) 丽毛管蚜蝇 *Mallota bellus* (Li, 1997) (图 313)

Paramesembrius bellus Li, 1997: 414-415.

体长 11.0mm，翅长 9.0mm。

雄性 头顶黑色，覆金黄色粉被；额黑色，覆浅黄粉被和同色毛；颜黑色，具白色粉被和同色毛，中突较大，亮黑色，其下部被稀疏的白短毛，中条黑色，不伸达触角基部。触角黄褐色，第 3 节卵圆形，长于基部 2 节之和；芒裸，基半部黄色，端半部黑褐色。中胸背板黑色，覆浅黄粉被和短黄毛，无纵条纹和斑点；小盾片黑色，端半部被褐色粉被，整个小盾片被黄色毛；中胸侧板黑色，粉被白色，具稀疏的浅黄色毛。腹部橘