

条纹；小盾片淡黄色，基缘黑色，覆淡黄色长毛；侧板黑色，覆灰色粉被，被灰色长毛。腹部黑色，第1背板和第2节基半部具淡色长毛，第2节后半部和第3节具黑色长毛，第4、5节毛长，淡黄色。各足腿节和胫节黑色；被毛主要黑色；后足腿节稍大，呈拱形，顶端侧面具小刺斑点，所有跗节红褐色。翅透明，仅基部和翅痣褐色。

分布 黑龙江(江山娇)。




图 314 类蜂毛管蚜蝇 *Mallota bombiformis* Li (仿 Li, 1996)

a. 头 (侧面观) (head in lateral view) b. 触角 (antennae) c. 雄性外生殖器 (侧面观) (male genitalia in lateral view) d. 雄性外生殖器 (腹面观) (male genitalia in ventral view) e. 阳茎 (aedeagus)

(420) 离斑毛管蚜蝇 *Mallota dimorpha* (Shiraki, 1930)

*Imatisma dimorpha* Shiraki, 1930: 202-204.

*Mallota dimorpha* (Shiraki, 1930): Peck, 1988: 200.

体长 17-20mm。

雌性 复眼毛白色，短；额侧缘弯曲，覆灰色粉，中部粉被褐色，毛金黄色；触角亮黑色；新月片黄褐色，侧面和基部覆灰粉和金黄色毛；头顶覆灰粉和金黄色毛；颜面覆白粉和柠檬色毛，中突两侧亮黑色；眼缘狭，无毛，覆白粉；后头具金黄色毛；颊覆灰粉和黄毛。触角黑色，第3节略带圆形，基部狭侧有1个较大的洞窝；芒黄色，顶端黑色。背板黑色，短粗；小盾片近方形；肩胛大，拱形，前半部覆灰粉，后面黑色；肩和翅后胛及后缘毛长并成束；小盾片红褐色，覆灰粉和许多柠檬黄色长毛，雄性中胸侧

初二版

片毛红黄色。腹部黑色具亮铜色光泽；2、3、4 节后缘黑色，无光泽；第 2 节具 1 不明显的褐色大三角形侧斑；第 5 节全黑色，毛黑色，短，两侧有许多同色鬃，无斑点，径横脉位于中室之后，直，中室下角有 1 短的附加脉。腋瓣褐色边缘暗色，有长毛。平衡棒黄褐色，球部褐色。前足腿节顶端和胫节黑色，前足跗节黄色，毛黑色；腿节基部和前足胫节具很多黄毛；后足腿节有很多黑色鬃状毛；后足胫节弯曲，下缘顶端一半有很多黑色直立稀长毛。

分布 中国东北。(摘译自 Shiraki, 1930)

(421) 台湾毛管蚜蝇 *Mallota formosana* (Shiaki, 1930) (图 315)

*Paramallota formosana* Shiraki, 1930: 196-199.

*Mallota formosana* (Shiaki, 1930): Knutson *et al.*, 1975: 355.




图 315 台湾毛管蚜蝇 *Mallota formosana* (Shiraki) (仿 Shiraki, 1930)

a. 头 (前面观) (head in frontal view) ♀ b. 头 (侧面观) (head in lateral view) c. 头 (背面观) (head in dorsal view) d. 触角 (antenna) e. 后足 (hind leg)