

片毛红黄色。腹部黑色具亮铜色光泽；2、3、4 节后缘黑色，无光泽；第 2 节具 1 不明显的褐色大三角形侧斑；第 5 节全黑色，毛黑色，短，两侧有许多同色鬃，无斑点，径横脉位于中室之后，直，中室下角有 1 短的附加脉。腋瓣褐色边缘暗色，有长毛。平衡棒黄褐色，球部褐色。前足腿节顶端和胫节黑色，前足跗节黄色，毛黑色；腿节基部和前足胫节具很多黄毛；后足腿节有很多黑色鬃状毛；后足胫节弯曲，下缘顶端一半有很多黑色直立稀长毛。

分布 中国东北。(摘译自 Shiraki, 1930)

(421) 台湾毛管蚜蝇 *Mallota formosana* (Shiaki, 1930) (图 315)

Paramallota formosana Shiraki, 1930: 196-199.

Mallota formosana (Shiaki, 1930): Knutson *et al.*, 1975: 355.




图 315 台湾毛管蚜蝇 *Mallota formosana* (Shiraki) (仿 Shiraki, 1930)

a. 头 (前面观) (head in frontal view) ♀ b. 头 (侧面观) (head in lateral view) c. 头 (背面观) (head in dorsal view) d. 触角 (antenna) e. 后足 (hind leg)

体长 15-18mm。

雌性 头顶狭，光亮，具黑色毛；额覆褐色粉被，两侧淡灰黄色粉被宽，毛柠檬黄色；颜覆白灰色粉被，中突宽，略亮黑色，颜毛白色，长。复眼被白色毛，上半部毛黄褐色。触角黑色，基节暗栗褐色；芒细长，黑褐色，基半部红黄色。中胸背板黑色，前半部及后缘被灰色粉被，其余部分覆褐黑色粉被，背板被毛柠檬黄色，肩胛很拱起，被长而密的柠檬黄色毛，翅后胛被同色毛和一些黑鬃；小盾片柠檬黄色或蜡黄色，毛柠檬黄色；侧板黑色，覆灰色粉被和长而密的柠檬黄色毛。腹部黑色；第1节粉被灰色，毛黄色；第2节前半部覆少量灰色粉被，两侧具金黄色三角形的毛斑和红黄色侧斑纹；第2-4节前半部粉被灰色，毛黄褐色，其余毛黑色，中部具狭褐粉被和直横带，横带不达各节的侧缘；第5节全亮黑色，被黑色长毛。足细长，亮黑色，前足胫节、跗节和后足胫节基部1/3褐色；足毛黄色，腿节和胫节毛长，后足腿节毛尤其长，前、中足腿节上侧和内侧黑毛短，后足腿节端半部被很多鬃状黑色短毛；后足胫节端半部上、下缘毛长而密，黑色。翅透明，端半部狭暗色。腋瓣淡黄褐色，边缘淡黄色，缘毛色更亮些，短。平衡棒褐色。

雄性 额除触角突顶端亮黑色外，几乎覆灰粉被和白色长毛；颜较宽。腹部除每节后缘中部毛黑色外，毛橙黄色，密，污褐色横带较雌性宽。(摘译自 Shiraki, 1930)

分布 中国台湾。

(422) 血红毛管蚜蝇 *Mallota haemorrhoidalis* Sack, 1927

Mallota haemorrhoidalis Sack, 1927: 317; Knutson *et al.*, 1975: 355.

Paramallota haemorrhoidalis Shiraki, 1930: 192-193.

体长 15-16mm。

雌性 头顶略光亮，黑色，被黑褐色粉被和黑色长毛；额亮褐色，上半部覆褐色粉被，两侧毛黄褐色，额突基部被白色粉被，具不明显的狭横带，两侧各具1纵条纹；颜亮黑色，除中部和两侧外，被黄色毛。复眼被稀少白毛，前部少量褐色毛。触角暗栗褐色；芒较细，略长于触角。背板肩胛很拱起，亮黑色，前半部覆褐粉被和红褐色毛，后半部覆少量黑色粉被和黄色毛；侧板亮黑色，被灰色粉被，中侧片、腹侧片覆密粉被和橙黄色长毛。腹部亮黑色，第1节覆灰粉被和淡黄色毛，两侧毛红黄色；第2节毛黑色，两侧红黄色，基部毛甚长；第3节毛黑色，两侧和后缘毛红黄色；第4、5节毛全黄色。翅黄色，端部褐色；腋瓣暗褐色，边缘毛短，黄色。平衡棒褐色。足红褐色，各足基节和转节、前中足腿节基部和后足腿节基部2/3黑色；腿节具很多长短不一的黑毛，后足腿节中等粗，略弯曲；后足胫节毛红黄色，下缘端半部毛黑色。

雄性 中胸侧板毛黑色。腿节几乎整个黑色，毛红褐色，前足胫节和跗节黑褐色。(摘