

体长 15-18mm。

雌性 头顶狭，光亮，具黑色毛；额覆褐色粉被，两侧淡灰黄色粉被宽，毛柠檬黄色；颜覆白灰色粉被，中突宽，略亮黑色，颜毛白色，长。复眼被白色毛，上半部毛黄褐色。触角黑色，基节暗栗褐色；芒细长，黑褐色，基半部红黄色。中胸背板黑色，前半部及后缘被灰色粉被，其余部分覆褐黑色粉被，背板被毛柠檬黄色，肩胛很拱起，被长而密的柠檬黄色毛，翅后胛被同色毛和一些黑鬃；小盾片柠檬黄色或蜡黄色，毛柠檬黄色；侧板黑色，覆灰色粉被和长而密的柠檬黄色毛。腹部黑色；第1节粉被灰色，毛黄色；第2节前半部覆少量灰色粉被，两侧具金黄色三角形的毛斑和红黄色侧斑纹；第2-4节前半部粉被灰色，毛黄褐色，其余毛黑色，中部具狭褐粉被和直横带，横带不达各节的侧缘；第5节全亮黑色，被黑色长毛。足细长，亮黑色，前足胫节、跗节和后足胫节基部1/3褐色；足毛黄色，腿节和胫节毛长，后足腿节毛尤其长，前、中足腿节上侧和内侧黑毛短，后足腿节端半部被很多鬃状黑色短毛；后足胫节端半部上、下缘毛长而密，黑色。翅透明，端半部狭暗色。腋瓣淡黄褐色，边缘淡黄色，缘毛色更亮些，短。平衡棒褐色。

雄性 额除触角突顶端亮黑色外，几乎覆灰粉被和白色长毛；颜较宽。腹部除每节后缘中部毛黑色外，毛橙黄色，密，污褐色横带较雌性宽。(摘译自 Shiraki, 1930)

分布 中国台湾。

(422) 血红毛管蚜蝇 *Mallota haemorrhoidalis* Sack, 1927

Mallota haemorrhoidalis Sack, 1927: 317; Knutson *et al.*, 1975: 355.

Paramallota haemorrhoidalis Shiraki, 1930: 192-193.

体长 15-16mm。

雌性 头顶略光亮，黑色，被黑褐色粉被和黑色长毛；额亮褐色，上半部覆褐色粉被，两侧毛黄褐色，额突基部被白色粉被，具不明显的狭横带，两侧各具1纵条纹；颜亮黑色，除中部和两侧外，被黄色毛。复眼被稀少白毛，前部少量褐色毛。触角暗栗褐色；芒较细，略长于触角。背板肩胛很拱起，亮黑色，前半部覆褐粉被和红褐色毛，后半部覆少量黑色粉被和黄色毛；侧板亮黑色，被灰色粉被，中侧片、腹侧片覆密粉被和橙黄色长毛。腹部亮黑色，第1节覆灰粉被和淡黄色毛，两侧毛红黄色；第2节毛黑色，两侧红黄色，基部毛甚长；第3节毛黑色，两侧和后缘毛红黄色；第4、5节毛全黄色。翅黄色，端部褐色；腋瓣暗褐色，边缘毛短，黄色。平衡棒褐色。足红褐色，各足基节和转节、前中足腿节基部和后足腿节基部2/3黑色；腿节具很多长短不一的黑毛，后足腿节中等粗，略弯曲；后足胫节毛红黄色，下缘端半部毛黑色。

雄性 中胸侧板毛黑色。腿节几乎整个黑色，毛红褐色，前足胫节和跗节黑褐色。(摘

译自 Shiraki, 1930)

分布 中国台湾。

(423) 亮黄毛管蚜蝇 *Mallota hysopia* Vockeroth, 1975

Mallota hysopia Vockeroth, 1975: 355.

Paramallota horishana Shiraki, 1930: 194-195.

Mallota orientalis Sack, 1927: 318.

Mallota horishana (Shiraki, 1930): Knutson *et al.*, 1975: 355.

体长 17-21mm。

雌性 头顶粉被黑褐色和毛黑色；额突小，覆黑褐色粉被，侧缘覆橙黄色细粉被和黑色毛；颜侧面观在触角基部很凹入，中突大，颜下部略宽，覆黄褐色粉被，中纵条亮黑色，两侧污黑色，毛橙黄色，中部毛黑色。复眼被毛密，黑色。触角黑褐色，第3节覆密灰粉被，横卵形，宽为长的1.5倍；芒细长，黑褐色，基部色较淡。中胸背板甚拱起，肩胛小，前半部覆黄褐色粉被，后半部黑色；背板被毛密，黄褐色，两侧毛较长，尤其肩胛和翅后胛毛更长；小盾片半圆形，黄褐色，端缘略淡，橙黄色毛长；侧板覆灰黄色粉被，中侧片、腹侧片和具翅侧片上部被橙黄色长毛。腹部略尖，亮黑色；第1节覆白粉被和黑色密毛，第1节和第2节前半部及第3节前缘毛长，淡黄色，尤其第2节两侧毛更长并成簇。足黑色，中足胫节和跗节淡色；后足腿节几乎直，中等粗，后足跗节较粗；足毛多数为黑色，基节、前足腿节基部外侧和中足胫节外缘毛橙黄色或红黄色，中足胫节的其余部分银白色，跗节下面毛红褐色或黄色；基节、后足腿节上、下缘和后足胫节、前足腿节外侧毛很多。翅略黄色，端半部明显褐色。腋瓣灰色，边缘暗褐色，缘毛长，黄褐色。平衡棒黄褐色，球部暗色。

雄性 额两侧沿眼缘覆黄灰色粉被和橙黄色毛；颜面狭。腹部不尖。(摘译自 Shiraki, 1930)

分布 中国台湾。

(424) 南京毛管蚜蝇 *Mallota nanjingensis* Li, 1996 (图 316)

Mallota nanjingensis Li, 1996: 226-228.

体长 16.5mm。

雄性 头顶三角小，黑色，在前部1/3覆灰色粉被，后部2/3具黑色长鬃；额密覆黄白粉和黑毛；颜在触角下面深凹入，黑色，覆淡黄色粉和同色毛，中突小，亮黑色。中胸背板黑色，基半部覆灰色粉被和黄色毛，后半部覆黑色粉被和黑毛；后缘毛淡黄色；