

分布 北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、海南、四川、云南、新疆、台湾；印度，锡兰，马来西亚，婆罗洲？。

(412) 拟毛管蚜蝇 *Mallota matolla* Knutson, 1975

Mallota matolla Knutson, 1975: 355 (n. name for *orientalis* Macquart, 1842: 69).

体长 11mm。

额和颜向下逐渐加宽，额端部约 1/3 于头宽，前方中央黑色，毛黑褐色，两侧密覆黄白色粉被和淡黄色长毛；颜在触角下稍凹入，中突不明显突出，两侧密覆黄白色粉被和淡黄色长毛，正中黑条光亮。复眼密被灰色毛。触角第 3 节黑褐色，内侧各具 1 圆形感觉窝，第 3 节长略大于宽；芒裸，黑褐色。中胸背板前半部黑灰色，毛黄色，后半部黑色，毛同色；侧板黑灰色，密被黄长毛；小盾片黄色，毛长同色。腹部黑色，略具光泽；第 1 节灰色，毛黄白色；第 2 节具 1 对红黄色或红褐色斑，两斑及其间毛黄色，其余部分黑色，毛黑色；第 3、4 节前缘具宽的黄褐色粉被横带，后半部毛黑色，两侧毛黄色；第 5 节亮黑色，毛黑色。足黑色，仅前足胫节基半部及中足胫节基部 3/4 褐色，爪垫黄色；后足腿节明显加粗，后足胫节弯曲；前、中足毛黄色，后足毛黑色，仅腿节上侧毛黄色。翅略带黄色，中部具界限不明显的褐斑。平衡棒褐黄色。

共检查 2 号标本：

云南(车里-勐海，720m，1957.IV.23，1 个；西双版纳勐岩，600m，1993.IX.11，1 个)。

分布 云南、台湾；马来西亚。

(413) 东方毛管蚜蝇 *Mallota orientalis* (Wiedemann, 1824) (图版 VI: 5)

Eristalis orientalis Wiedemann, 1824: 38.

Mallota orientalis (Wiedemann, 1824): Knutson *et al.*, 1975: 355.

体长 15mm。

头顶和额黑色，整个毛长红黄色；雌性额两侧覆淡黄色粉被和毛，正中毛黑色；颜两侧具红黄色宽纵条，其上密被红黄色或淡黄色长毛，正中条及复眼下方两侧条裸，亮黑色，中突宽平；后头宽，覆黄粉被和同色毛。雄性两眼连线中等长，复眼密被黄褐色长毛；触角黑褐色；芒红褐色，长。中胸背板黑色，覆黄色粉被，密被中等长黄色毛；小盾片红黄色，被黄色长毛。腹部亮黑色，第 2 节两侧具大的三角形黄斑，两斑在背板中部不相连，两侧斑几乎占整个背板侧缘，其后在各节交界处具黄横带；腹部被毛黄色。足黑色，腿节端部、前、中足胫节基部 1/3、中足胫节大部黄褐色，跗节棕黑色，有时