

1 个; 中甸大雪山垭口, 1981.VIII.18, 1 个)。

分布 河北、内蒙古、吉林、四川、云南、甘肃; 原苏联, 蒙古国, 日本; 欧洲。
我国有记载而未见标本的种类:

(149) 黄氏美蓝食蚜蝇 *Melangyna hwangi* He et Li, 1992 (图 113)

Melangyna hwangi He et Li, 1992: 86-87.

体长 8.5mm。

雄性 头顶三角覆淡黄白色粉被及褐毛; 额黑褐色, 覆黄白色粉被及黑褐色长毛; 颜淡黄色, 中条黑褐色, 除中条外, 颜覆黄色粉被及同色毛。触角全部黑色, 第 3 节呈椭圆形; 芒黑色, 基半部略粗。中胸背板亮黑色, 略具铜色光泽, 微覆淡白色粉被, 但两侧在横缝之后的粉被较浓, 毛淡黄色; 侧板黑色, 覆黄白色粉被及黄色长毛; 小盾片暗黄色, 大部分被淡褐色长毛, 只在前缘混杂少量黄毛。腹部背板黑色, 第 2-4 背板各具 1 对黄斑, 斑的侧缘均不达背板侧缘; 第 1 对黄斑略呈三角形, 斜置于背板前半部, 第 2、3 对黄斑呈长方形, 横置于背板前半部, 第 3 对黄斑前缘接近于背板前缘; 第 4、5 背板后缘各具狭黄带。足大部分为黑褐色, 仅前足腿节端部 2/3、中足腿节端部 1/3 和胫节全部、以及后足的膝部为黄褐色; 足毛黑色。翅淡黄褐色; 腋瓣黄白色, 边缘及缨毛淡黄色。平衡棒淡黄色。翅瓣全部被毛。

分布 新疆。




图 113 黄氏美蓝食蚜蝇 *Melangyna hwangi* He et Li ♂ (仿 He and Li, 1992)

a. 头 (侧面观) (head in lateral view) b. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view) c. 雄性外生殖器 (genitalia) d. 上叶 (superior lobe)