



图 318 黑色粉颜蚜蝇 *Mesembrius niger* Shiraki

a. 头 (前面观) (head in frontal view) b. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

(428) 瘤突粉颜蚜蝇 *Mesembrius tuberosus* Curran, 1925 (图版 VI: 7)

*Mesembrius tuberosus* Curran, 1925: 5; Knutson *et al.*, 1975: 356; Huang *et al.*, 1996: 189.

体长 12mm。

头顶三角长, 暗黑色, 毛黑色, 短; 额和颜黑色, 密覆灰白色粉被, 额毛黑色; 颜毛黄褐色, 中条裸, 亮黑色。触角第 3 节黑褐色, 长宽约相等; 芒黄褐色, 裸。中胸背板黑色, 具 2 对黄褐色粉被纵条, 两侧条位于背板侧缘, 宽, 亚中条较狭, 达背板后缘, 后部相连, 背板毛黄色, 后部混有黑短毛。腹部黑色, 具大黄斑; 第 1 节背板前侧角黄色; 第 2 节具 1 对很大的近三角形红黄斑, 斑外侧占整个背板侧缘, 内端角圆; 第 3 节红黄色, 后部具近三角形黑色至黑褐色斑; 第 4 节与第 3 节相似, 但后部黑斑较前节稍大; 腹部各节基部毛黄色, 端部黑色。中足腿节近基部下侧具乳状突起, 后足胫节弯曲, 侧扁, 后足基跗节粗大; 足黑色, 前、中足胫节基部及中足基跗节黄色; 足毛长、密, 前足腿节和胫节被长、密黄毛, 中足腿节背面毛较长, 胫节毛短, 后足腿节毛长, 黄色, 腿节末端毛和胫、跗节毛黑色。翅淡黄褐色。

共检查 4 号标本:

福建(沙县, 1979.VII.17, 1 个)、广西(金秀, 600m, 1999.V.20, 1 个)、贵州(江口梵净山, 550m, 1988.VII.14, 1 个; 雷山桃江, 870-1100m, 1988.VII.5, 1 个)。

分布 福建、湖南、广西、贵州、云南; 东南亚; 新几内亚。

我国有记载而未见标本的种类: