

白色毛组成 1 对亚中纵条；腹面蓝黑色，第 1-3 节后缘黄白色，毛银白色。足蓝黑色，毛白色；各足膝部及胫节基部黄色，各足腿节近基部内侧具 1 痕印，前足腿节印痕基侧毛金黄色，短；足毛白色，胫节毛长。翅淡褐色。

检查标本 1 个。

海南(尖峰岭, 1961.XII, 1 个)。

本种为我国新记录种。

分布 海南；印度，尼泊尔。




图 411 丽巢穴蚜蝇 *Microdon bellus* Brunetti ♂
胸、腹部 (背面观) (thorax and abdomen in dorsal view)

(570) 小巢穴蚜蝇 *Microdon caeruleus* Brunetti, 1908 (图版 VIII: 18)

Microdon caeruleus Brunetti, 1908: 92; Knutson *et al.*, 1975: 369.

体长 5-8mm。

雄性 额中部略变狭，雌性两侧平行；颜与额等宽，雄性颜宽为头宽的 1/3；头顶、额和颜亮蓝黑色，头顶和额毛暗棕色，颜毛灰白色；后头宽，黑色，被灰色毛。触角黑褐色，第 3 节略长于第 1 节，第 2 节很短；芒黄褐色，短于第 3 触角节。中胸背板紫黑色，侧板及小盾片同色，小盾片后缘具 2 个短而钝但又很明显的针突。腹部宽扁，深紫黑色，各节后缘具白色毛带。足黄褐色，基节、转节、腿节基部及胫节端部黑褐色。翅略染烟色。

雌性 额两侧平行；颜宽为头宽的 $1/4$ 。

此种足色泽变异大，有的几乎全为黄褐色，有的大部分黑褐色，仅腿节端部及胫节基部黄褐色。

共检查 35 号标本：

浙江(舟山, 1931.VI.11, 1 个；松阳, 1989.VII.29, 1 个)、福建(崇安, 240-740m, 1960.VIII.24-IX.15, 2 个)、山东(青岛崂山, 1973.VI.22, 1 个)、湖北(武当山, 1984.VI.3, 2 个)、四川(峨眉山, 550-2000m, 1957.V.9-VIII.14, 19 个)、云南(橄榄坝, 1957.X.24, 1 个)、甘肃(1930.V.23, 4 个, 1939.VI.18, 4 个)。

分布 浙江、福建、山东、湖北、广东、四川、云南、甘肃、台湾；日本，印度。

(571) 狭腹巢穴蚜蝇 *Microdon chapini* Hull, 1941 (图 412)

Microdon chapini Hull, 1941: 438; Knutson *et al.*, 1975: 369.




图 412 狭腹巢穴蚜蝇 *Microdon chapini* Hull
胸、腹部 (背面观) (thorax and abdomen in dorsal view)

体长 9mm。

雄性 额中部略变狭；被极稀短的淡色毛；头顶和额黑色，毛黄色；颜中部黑色，两侧沿眼缘黄色，下部黄色向中间扩展，颜毛白色，口缘黑褐色；后头宽，黑色，顶部被黄毛，中、下部被白毛。触角基部 2 节黑褐色，第 3 节红褐色，覆灰白色粉被，第 1 节长为端部 2 节之和，第 3 节长为第 2 节的 2 倍。中胸背板黑色，肩胛及翅后胛红褐色，