

福建(崇安, 1940.IV.20, 1个; 建阳黄坑桂林, 270-590m, 1960.IV.14, 1个)。

分布 浙江、福建(模式产地)、广西。

(457) 玉带迷蚜蝇 *Milesia balteata* Kertész, 1901 (图 337, 图版 VI: 15)

Milesia balteata Kertész, 1901: 414; Knutson *et al.*, 1975: 362; Huang *et al.*, 1996: 191; Cheng, 2003: 273.

Milesia himalayensis Brunetti, 1908: 82.

体长 22mm。



图 337 玉带迷蚜蝇 *Milesia balteata*
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

体粗壮, 多毛。头黑色, 雄性头顶三角长, 单眼前覆白粉被和同色直立长毛, 其后毛黑色, 长; 雄性额和颜覆白粉被, 额突两侧及其下颜两侧具黄斑, 额中央黑色; 颜正中具黑色中条; 颊黑色, 光亮, 在复眼正下方具红褐色斑; 后头密覆白粉被和同色长毛。触角黄褐色至黑褐色, 第3节上侧圆, 下侧向前突出, 角圆; 芒近乎裸。中胸背板黑色, 密覆红黄色粉被和直立黄长毛, 背板前缘、盾沟及后缘粉被厚, 略呈淡色带, 两侧和后缘毛长; 小盾片黄色, 基部色暗, 密被直立黄色长毛; 侧板黑色, 密覆白色粉被和黄色长毛。腹部黑色, 背板光亮, 仅第2节基部2/3淡黄色; 第3节基部具极狭的淡黄色带; 腹部两侧基部毛黄色, 长, 其余黑色。足粗大, 黑色, 毛密长, 以中、后足最为显著; 前足腿节端部及胫节基部黄色, 有时黄色沿外侧向腿节基部和胫节端部延伸成纵条斑; 中足腿节端部及外侧2/3、胫节及基跗节除末端外黄色; 前足腿节外侧基半部毛长, 黄白色, 端半部毛短, 黑色, 前足胫节外侧黑色毛长; 中足腿节和胫节外侧白色毛长; 后足腿节外侧毛白色, 长, 内侧毛黑色, 后足胫节黑色毛长; 后足腿节近端部外侧具1粗大的指状突起; 后足胫节弯曲, 中部略膨大。翅透明。

雌性额和颜光亮。

共检查 33 号标本：

广西(龙州, 240m, 1982.V.21, 1 个)、海南(1934.III.21-VI.5, 7 个)、贵州(茂兰, 1990.V.11-15, 2 个)、云南(西双版纳, 650m, 1957.III.17-30, 2 个, 1050-1200m, 1958.V.12-X.17, 3 个, 600-700m, 1994.III.28-IV.18, 6 个; 小勐养, 850m, 1957.IV.2-V.6, 2 个; 思茅-普文龙山, 950-1300m, 1957.V.11, 1 个; 车里石灰窑, 750m, 1957.IV.27, 2 个; 勐龙, 1600m, 1958.IV.24, 1 个; 勐仑, 1994.II.30-IV.21, 5 个; 勐啊, 1982.IV.18, 1 个)。

分布 广西、海南、贵州、云南; 老挝, 泰国, 印度, 马来西亚。

(458) 黄带迷蚜蝇 *Milesia cretosa* Hippa, 1990 (图 338, 图版 VI: 14)

Milesia cretosa Hippa, 1990: 122.

Milesia ruiliana Yang *et* Cheng, 1996: 191; Synonymized by Cheng, 2003: 273.

Milesia tachina Yang *et* Cheng, 1996: 193; Synonymized by Cheng, 2003: 273.

体长 15-19mm。

头顶红褐色, 毛黑色, 直立, 长, 单眼三角前覆黄粉被及白毛; 额和颜红黄色至红褐色, 覆同色毛和粉被; 颊前纵条黑色, 短, 该纵条不达口缘且有时不明显; 后头被黄毛和同色粉被。触角红褐色至黑褐色, 下角很突出; 芒较短, 与触角同色。中胸背板红褐色, 具轮廓明显的大块黑斑, 该斑被背板中部的 1 对从前缘至后缘的淡色粉被亚中条分割成 3 条斑; 正中条斑从前缘至近后缘, 但不达后缘, 侧条斑前端大, 后端小, 中部被红褐色盾沟分割, 背板后缘覆黄粉被; 小盾片红褐色, 两基角黑色; 侧板黑色, 具大块红褐斑。腹部基部 2 节黑色, 第 2 节基部具亮黄色横带, 后缘具不明显的红褐色横带; 第 3 节基半部黑色, 具宽黄横带, 端半部红褐色, 中央黑中条短, 该中条有时扩展成三角形; 第 4 节基部 1/3 处具狭的黑色波形横带, 带前黄色, 带后红褐色, 黑带中央向后延伸成黑中条; 第 2-4 节后缘黑色, 狭。足基部 2 节黑色或黑褐色; 前足转节黑褐色, 腿、胫、跗节红褐色; 中、后足腿节基部 2/3 黑色, 端部 1/3 红褐色, 胫、跗节黄色。翅前半部褐色。

共检查 9 号标本：

海南(1936.IV.17, 1 个)、云南(金平, 1500-1700m, 1956.V.11, 1 个; 景东, 1400m, 1956.V.25, 1 个; 维西, 3250m, 1981.VII.10-13, 2 个; 西双版纳, 1200-1400m, 1958.V.17, 1 个; 畹町, 830m, 1977.VI.11 个; 盈江, 1700m, 1980.IV.4, 1 个; 瑞丽, 1981.V.4, 1 个)。

分布 海南、云南; 印度, 缅甸。