

雌性 腿、胫、跗节红褐色，暗色部分不同程度减。

云南标本与广西、福建的标本略有不同：中胸背板盾沟前具 1 对黑色侧斑。

共检查 6 号标本：

福建(将乐龙栖山，650m，1990.IX.17，1 个，1991.X.19，1 个，西芹，1987.X.14，1 个)、云南(西双版纳，850m，1957.VI.11，1 个，1050-1080m，1958.VIII.6，1 个，620-650m，1959.V.24，1 个)。

分布 福建(模式产地)、广西、云南。



图 341 马氏迷蚜蝇 *Milesia maai* Hippa
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

(462) 寡斑迷蚜蝇 *Milesia paucipunctata* Yang et Cheng, 1992 (图 342)

Milesia paucipunctata Yang et Cheng, 1992: 44; Huang *et al.*, 1996: 191; Cheng, 2003: 275.

体长 17mm。

头红褐色，头顶具 1 近三角形黑斑，从头后缘至单眼三角内；头顶和额毛黑褐色，额两侧及颜覆黄色粉被；后头黑色，毛同色。触角红黄色，芒同色。中胸背板全黑色，仅中部沿盾沟具 1 对狭的黄粉被横带，肩胛、翅后胛略带红色；侧板黑色，中侧片后部略带红色；小盾片黑色，仅后缘狭边略带红色；胸部毛短，红褐色；侧板黑褐色，中侧片后部略带红色。腹部基部 2 节黑色；第 3 节黑色，基部 1/3 具 1 对红黄色三角形横斑，两斑中间相隔约为 1/3 背板宽；第 4 节基半部黑色，具 1 对大的近长方形横斑，达背板前缘，两斑内侧不相连，斑后为黑横带；背板端半部红褐色，前缘中央向前突出，后缘黑色极狭；背板毛红褐色，基部 2 节侧缘黑色。足基节黑色；转节和腿节黑褐色，后足腿节端部色淡；胫、跗节红黄色，前足胫跗节缺损。翅黄褐色，前半部黑褐色。

共检查 1 号标本：

福建(冯地, 1988.VI.9, 1 个)。

分布 福建。




图 342 寡斑迷蚜蝇 *Milesia paucipunctata* Yang et Cheng
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

(463) 黑色迷蚜蝇 *Milesia quantula* Hippa, 1990 (图 343)

Milesia quantula Hippa, 1990: 44.

Milesia atricorporis Yang et Cheng, 1992: 45: Synonymized by Cheng, 2003: 275.

体长 17mm。

雄性 体黑色，体表粗糙。头顶黑色，被白色长毛，混有黑色毛；额鲜黄色，密覆同色粉被；颜两侧黑褐色，中部具鲜黄色中条，从触角基部至近口上缘，颜下半部两侧具 1 对大的黄粉被斑，与中条相连成 1 宽横带。触角黄褐色；芒与触角同色。中胸背板及小盾片全黑色，肩胛及翅后胛略呈红褐色；侧板黑色，前胸侧板略呈红褐色；胸部被毛短，淡褐色。腹部全黑色，具光泽，第 1-3 节后缘黄色至锈红色狭；背板被毛大部分黑色，两侧混有白毛，侧缘毛白色，第 1-3 节后缘毛黄白色，长，第 4 节后缘被黑色长毛。足黑褐色，各足腿节端部及中足基跗节红褐色；足毛淡色，混有黑毛。翅前半部黑褐色。

雌性 头顶和额黑色，额两侧沿眼缘覆白粉被，额突基部两侧具黄色横斑，该斑从眼缘至额突端部，额突下方颜部黄色，与额突黄色侧斑相连成 1 宽的黄带，颜其余部分黑色。雌性其他特征同雄性。

共检查 2 号标本：

福建(黄坑, 1988.VI.10, 1 个)、四川(峨眉山报国寺, 550-750m, 1957.VI.14, 1 个)。

分布 福建、四川；缅甸。