

福建(冯地, 1988.VI.9, 1个)。

分布 福建。




图 342 寡斑迷蚜蝇 *Milesia paucipunctata* Yang et Cheng  
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

(463) 黑色迷蚜蝇 *Milesia quantula* Hippa, 1990 (图 343)

*Milesia quantula* Hippa, 1990: 44.

*Milesia atricorporis* Yang et Cheng, 1992: 45: Synonymized by Cheng, 2003: 275.

体长 17mm。

**雄性** 体黑色，体表粗糙。头顶黑色，被白色长毛，混有黑色毛；额鲜黄色，密覆同色粉被；颜两侧黑褐色，中部具鲜黄色中条，从触角基部至近口上缘，颜下半部两侧具1对大的黄粉被斑，与中条相连成1宽横带。触角黄褐色；芒与触角同色。中胸背板及小盾片全黑色，肩胛及翅后胛略呈红褐色；侧板黑色，前胸侧板略呈红褐色；胸部被毛短，淡褐色。腹部全黑色，具光泽，第1-3节后缘黄色至锈红色狭；背板被毛大部分黑色，两侧混有白毛，侧缘毛白色，第1-3节后缘毛黄白色，长，第4节后缘被黑色长毛。足黑褐色，各足腿节端部及中足基跗节红褐色；足毛淡色，混有黑毛。翅前半部黑褐色。

**雌性** 头顶和额黑色，额两侧沿眼缘覆白粉被，额突基部两侧具黄色横斑，该斑从眼缘至额突端部，额突下方颜部黄色，与额突黄色侧斑相连成1宽的黄带，颜其余部分黑色。雌性其他特征同雄性。

共检查2号标本：

福建(黄坑, 1988.VI.10, 1个)、四川(峨眉山报国寺, 550-750m, 1957.VI.14, 1个)。

分布 福建、四川；缅甸。




图 343 黑色迷蚜蝇 *Milesia quantula* Hippa  
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

(464) 中华迷蚜蝇 *Milesia sinensis* Curran, 1925 (图 344, 图版 VI: 19)

*Milesia sinensis* Curran, 1925: 3; Cheng, 2003: 276.

*Milesia ammochrysus* Seguy, 1948: 166: Synonymized by Hippa, 1990: 163.

体长 20-30mm。

**雄性** 头顶三角长，单眼三角前黄色，被黄色密粉被和同色长毛，单眼三角及其后黑色，毛黑色，长；额正中黑色或黑褐色，两侧黄色；颜中部凹入，无中突，黄色，具少量黄毛；颊黄色，颊前复眼下角至口缘具黑条纹。触角黄褐色；芒长而裸。中胸背板黑色，毛黄色，肩胛黄色，其内侧与黄色狭粉条相连，后者达盾沟，且与盾沟的黄粉带相接，翅后胛覆宽的黄粉被横带，中部略向上收缩，露出狭的黑色三角后缘；小盾片半圆形，基部 1/3 黑色，其余黄色，后缘具边，黄色毛长，混杂少量黑色短毛，盾下毛明显；侧板黄色，覆密黄粉被和同色长毛，具宽的黑色纵条，并与背板肩胛后黑色相连，在后气门和中足基节之间具 1 黑色斜条斑。腹部可见 4 节，黄色，各节后缘及第 2-4 节前缘黑色狭；第 2 节黑色中纵条达背板 2/3 长，且与其后的黑色横带相接，横带呈波浪形，两侧及中央向前弯曲；第 3 节具与第 2 节相似的黑色横带，位于背板 1/2 处，两侧不向上弯曲，中纵条明显；第 4 节黑带狭，两侧位于背板中部，中央达离背板前缘 1/4 处，呈“∧”形；各节黑带前被黄色短毛，带后毛黑色，短。足黄色，前足腿节基部下侧具黑条斑，后足腿节下后侧具大黑斑，后足胫节下侧具褐斑，跗节除基跗节基部和末节外黑色；后足腿节近端部具粗大的指突；各足被黄毛，中足胫节外侧毛长，后足腿节和胫节下侧毛黑褐色，长。翅略呈黄色，翅基部及前缘褐黄色。腋瓣和平衡棒黄色。

**雌性** 头顶黑色；额覆密褐黄色粉被，正中条黑色。