

雄性未知。

本新种与侧斑柄角蚜蝇 *M. pleuralis* (Coquillett) 相似, 但后者腹部第 2、3 节背板黑色, 而新种大部分红黄色。

正模 ♀, 浙江莫干山, 1937.VI.9, O. Plel. 采; 副模 1♀, 同正模; 1♀, 甘肃, 1933.VIII.3, O. Plel. 采。

(232) 细小柄角蚜蝇 *Monoceromyia fenestrata* (Brunetti, 1923) (图 169, 图版 IV: 7)

Ceria fenestrata Brunetti, 1923: 333.

Monoceromyia fenestrata (Brunetti, 1923): Knutson *et al.*, 1975: 344.

体长 12mm。

体黑色。头黑色, 略具光泽; 颜两侧具 1 对中等宽的黄色纵条, 该纵条上宽下窄, 与中间黑色中条约等宽; 额突基部黄色, 端部黑色。触角黑色, 第 3 节覆褐色粉被; 端芒白色。中胸背板黑色, 肩胛黄色; 侧板及小盾片全黑色。腹部黑色, 第 2、4 节后缘黄色; 第 2 节基部收缩, 但不延长, 第 2 背板不及第 3 背板长; 第 4 节后缘具明显凹痕。足黑色, 腿节末端、胫节及跗节黄色; 各足胫节中部具暗环。翅前半部深褐色, 后半部透明。

共检查 11 号标本:

四川(峨眉山, 1955.V.13, 1 个; 报国寺, 1957.IV.12-VI.4, 9 个)、云南(金平河头寨, 1600-1700m, 1956.V.12, 1 个)。

本种为我国新记录种。

分布 四川、云南; 印度。



图 169 细小柄角蚜蝇 *Monoceromyia fenestrata* (Brunetti) ♀
腹部 (侧面观) (abdomen in lateral view)