

体长 23-27mm。

头顶及额黑色；额具 1 对大的黄色侧斑；额突黑色，基部腹面带红色；颜及颊黑色，颜两侧具宽的黄色纵条，约与黑中条等宽。触角黑色，第 3 节覆棕色粉被；端芒棕色。中胸背板黑色，肩胛黄色，盾沟两端具黄色大斑；侧板黑色，具 3 个大黄斑；小盾片两侧黄色，中部 1/3 黑色。腹部第 1 节黑色，两基角及两侧具黄斑；第 2 节很细长，细狭部黄褐至棕褐色，其后黑色，后缘黄色，黄横带两侧略宽；第 3、4 节黑色，后缘黄至红黄色，黄色沿两侧向前扩展成峰形，达两侧中部；第 5 节黑色；第 3-5 节背板覆棕色毛，末节毛密，明显。足基节、转节、腿节黑色，腿节末端及胫、跗节黑褐色；前、中足腿节外侧、后足腿节内、外侧具宽的黄色纵条；前、中足黄色纵条约占整个腿节长；后足黄纵条约占 2/3 腿节长。翅前半部深褐色。

共检查 5 号标本：

云南(西双版纳：600-1400m，1957.IV.8，1 个，1958.V.26，1 个，VIII.21，1 个，1994.IV.4-21，2 个)。

分布 云南；东洋区。




图 171 爪哇柄角蚜蝇 *Monoceromyia javana* (Wiedemann) ♀
胸部 (背面观) (thorax in dorsal view)

(235) 大斑柄角蚜蝇 *Monoceromyia macrosticta* Cheng et Huang, 1997 (图 172)

Monoceromyia macrosticta Cheng et Huang, 1997: 421.




图 172 大斑柄角蚜蝇 *Monoceromyia macrosticta* Cheng et Huang ♂
a. 头、胸、腹部 (背面观) (body in dorsal view) b. 腹部 (侧面观) (abdomen in lateral view)

体长 18mm(除额突和触角外)。

雄性 头鲜黄色，被黄色毛；头顶单眼三角及其后方正中黑褐色；颜具狭的黑色中条纹，从额突基部至口上缘，且具较宽的黑色侧条纹，从复眼角至口缘；额突长于触角第 1、2 节之和，额突近基部红褐色，基部周围黑色，黑色沿额三角正中向上扩展直达顶部并在顶部扩展成三角形。触角黑色；端芒白色。中胸背板黑色，覆黄色粉被和很短的黄毛，肩胛、盾沟两侧及盾沟后的侧纵条黄色，盾沟内侧具 1 对与盾沟两端黄斑大小相等的近圆形黄粉斑；小盾片长方形，宽约为长的 3 倍，基半部黑色，端半部黄色，后缘黄色向上收缩；侧板黑色，3 黄斑分别位于中侧片后部、腹侧片及后侧片上。腹部第 1 节基角及两侧黄色，其余黑色；第 2 节强烈收缩，延长，长约为第 3、4 节之和，红褐色，近后缘狭黑色，后缘狭黄色；第 3 节黑色，具 1 对宽的红褐色斜斑，其上覆黄粉被，后缘红褐色，两侧与斜斑相连；第 4 节黑色，具 1 对与第 3 节同样形状和色泽的斜斑，该斑较第 3 节小，其上覆黄色粉被，其外侧近基角具 1 金黄色小粉斑，其内侧两斑之间具 1 大的三角形金黄色粉斑，该粉斑正中被 1 黑中条分开，后缘红褐色；第 5 节红褐色。足红褐色，各足基节、中、后足转节黑色，腿节基部色暗；前、后足腿节基半部外侧具黄纵斑，跗节端部色暗；前足胫节被密黄短毛，中足胫节腹面前缘及跗节腹面被

黑刺。翅前半部变褐，具翅痣横脉。平衡棒及下腋瓣黄色。

检查 1 号标本：

云南(西双版纳勐腊勐仑，580m，1994.III.31，1 个)。

分布 云南。

(236) 黑色柄角蚜蝇，新种 *Monoceromyia melanosoma* Cheng, sp. nov. (图 173)

体长 15-17mm(加额突)。

雄性 头部黑色，密被明显的白短毛；额在触角基部两侧沿眼缘具 1 对很小的黄斑，斑的下方在颜两侧具 1 对同样大小的黄斑；颜两侧中部具 1 对狭的黄色纵条，从上部黄斑至口缘；额突黑色。触角棕黑色，第 3 节覆同色粉被；端芒褐色。中胸背板、侧板及小盾片全黑色，不具任何黄斑。腹部黑色，第 2 节细狭部分两侧棕色，后缘具狭黄横带；第 2 节很细长，长于第 3 节；第 4 节后缘具明显的凹痕带，其后边宽。足黑褐色。翅稍呈黄色，前半部黄褐色。




图 173 黑色柄角蚜蝇，新种 *Monoceromyia melanosoma* Cheng, sp. nov.

腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

雌性 大体与雄性相同。触角黑色；腹部第 2 节基部收缩，但不延长，第 2 节与第 3 节等长；第 4 节后缘无凹痕带；腹部黑色，第 2 节细狭部分略呈红色；第 3 节两侧后缘为不明显的红褐色。翅淡褐色，前半部深褐色，具紫色反光。

本种与老挝种 *M. salvazai* Shannon 相近，但后者小盾片后缘黄色，肩胛黄褐色，雌性第 4 节后缘无凹痕带。