

正模 ♂ 云南小勐养, 810m, 1957.III.30, 臧令超采; 配模 ♀, 云南勐啊, 1050-1080m, 王书永采。

(237) 侧斑柄角蚜蝇 *Monoceromyia pleuralis* (Coquillett, 1898) (图 174)

Sphiximorpha pleuralis Coquillett, 1898: 302.

Monoceromyia pleuralis (Coquillett, 1898): Peck, 1988: 179.

体长 16-20mm。

雄性 头顶黑或黑褐色; 额黑褐色, 两侧具黄斑; 颜前面观黄色, 具中等宽的黑褐色中条, 两侧及下部黑褐色, 有时口缘黑色, 颜黄色部分与额黄斑相连; 额突棕褐色。触角黑色, 第3节覆棕色粉被; 端芒白色。中胸背板黑色, 肩胛黄色, 盾沟两端具小黄斑; 侧板全黑色; 小盾片黑色, 后缘为极狭黄色。腹部黑色, 第2节与第3节等长或略短; 雄性第2节基部黄色, 后部黑褐色; 第2-4节后缘红黄色, 以第3节带最宽, 第4节带最狭; 腹部第4节背板无凹痕。足黑褐色, 腿节末端、胫节及跗节基部两节棕褐色; 胫节近中部具不明显暗环。翅淡黄色, 前半部深褐色, 具紫色光泽。

雌性 中胸背板盾沟两端小黄斑不明显。腹部第2节仅基部两侧角红黄色。

共检查2号标本:

山东(青岛1个)、四川(峨眉山报国寺, 550-750m, 1957.VI.9, 1个)。

分布 山东、四川; 原苏联(远东), 日本。




图 174 侧斑柄角蚜蝇 *Monoceromyia pleuralis* (Coquillett)
腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)