




图 176 三斑柄角蚜蝇 *Monoceromyia trinotata* (de Meijere)

a. 胸部 (背面观) (thorax in dorsal view) b. 雄性外生殖器 (腹面观) (male genitalia in ventral view) ♂ c. 雄性外生殖器 (侧面观) (male genitalia in lateral view) ♂

(241) 黄肩柄角蚜蝇 *Monoceromyia wiedemanni* Shannon, 1927

Monoceromyia wiedemanni Shannon, 1927: 47; Knutson *et al.*, 1975: 345; Sun, 1993: 1110.

体长 15-16mm。

雄性 头黑色，较胸宽；额在额突基部两侧眼缘处具圆形黄斑；额突棕褐色至黑色，基部及腹面色淡；颜两侧具黄色宽纵条直达口缘；后头下部略带棕红色。触角棕褐至黑色，各节约等长，基部两节之和与额突等长，端部两节覆淡色粉被；端芒短，片状，基部黑褐色，端部白色。中胸背板长略大于宽，密布细颗粒，暗黑色，仅肩胛黄色；小盾片黑色，后缘黄色极细狭；侧板暗黑色，无黄斑。腹部黑色，具细小颗粒似胸部，第2节约为第3、4节长之和；第3、4节极粗大，近球状，第3背板后缘棕色，略隆起；第4背板后缘之前具1深刻痕。足棕褐色；基节、转节、腿节极基部及跗节端部2节黑褐色。翅前半部深棕褐色，后部透明。腋瓣白色。平衡棒棕黄色。

雌性 头顶极明显隆起，黑色，头顶两侧棕红色；额亮黑色，两侧具暗黑大班，其上刻点极粗密，黄色额斑近三角形。翅后胛及小盾沟前两侧外角略带棕红色。腹部第2背板大部棕红色，第1-3背板后缘棕色，第4背板后缘褐棕色，第2背板近棕色后缘处黑褐色。足棕红至深棕色。

检查1号标本：

四川(泸定德威，1230m, 1983.VI.21, 1个)。

分布 四川、云南；老挝。