

**(358) 粗腿小喙蚜蝇 *Neoascia podagrica* (Fabricius, 1775)**

*Syrphus podagricus* Fabricius, 1775: 768.

*Musca molio* Harris, [1780]: 111.

*Musca tenur* Harris, [1780]: 112.

*Musca crassipes* Schrank, 1781: 450.

*Ascia lanceolata* Meigen, 1822: 187.

*Ascia maculata* Macquart, 1829: 169, 21.

*Neoascia podagrica* (Fabricius, 1775): Peck, 1988: 144.

体长 5.3mm。

**雌性** 体黑色，颜覆粉被，无中突。复眼裸，褐色，中部颜色更红些，具褐色横条纹。触角黑色，被灰粉，第3节基半部棕色，长方形，明显长于基部2节之和。中胸背板和小盾片黑色，被淡色毛，具细刻点。腹部黑色，具细刻点，被淡色毛；腹部第2节基部收缩，然后加宽；第2、3节中部两侧具棕色斑。前、中足整个棕色，后足基、转节黑色，腿节粗大，基部1/3棕色，顶端2/3暗黑色，胫节中部及基跗节暗色；足毛淡色。腋瓣黄白色，平衡棒棕色。

共检查2号标本：

黑龙江(哈尔滨, 1913.VII.21, 1个)、无地点(1913.VII.5, 1个)。

分布 黑龙江。

**57. 闪光蚜蝇属 *Orthonevra* Macquart, 1829**

*Orthonevra* Macquart, 1829: 188. Type species: *Chrysogaster elegans* Meigen, 1822 (mon.).

*Campeneura* Rondani, 1856: 52. Type species: *Campeneura venustus* Rondani, 1856 (mon.) [= *frontalis* (Loew, 1843)].

**属征** 体中等大小，黑色或铜绿色，具金属光泽。复眼裸，雄性复眼接眼。颜无中突；第3触角节很长或略长。腹部背面中部无光泽，但边缘具金属光泽。翅 r-m 脉位于中室中部之前，端横脉相当垂直，并急速廻转。

**分布** 古北区，东洋区，新北区，新热带区。

我国有描述的种类共5种，其中4种有标本。