

1983.VII.27, 2个)、江苏(1918.VII-1932.VIII.6, 15个)、浙江(临安, 1946.I.8, 1个)、山东(青岛, 1个)、西藏(昌都, 3900m, 1976.VIII.8, 1个)、青海(祁连, 1957.VIII.7, 1个)、新疆(阿勒泰, 1750-2050m, 1960.VIII.1-6, 2个; 吐鲁番, 20-140m, 1958.VI.29, 1个; 乌鲁木齐, 980m, 1958.V.19-1959.IX.5, 2个; 阿克苏, 1330m, 1959.VII.22, 1个, 新疆其他地点从略)。

**分布** 北京、河北、山西、内蒙古、东北、江苏、山东、西藏、青海、新疆; 原苏联, 蒙古, 伊朗, 阿富汗; 欧洲, 北非, 新北区。

### (61) 短舌小蚜蝇 *Paragus compeditus* Wiedemann, 1830

*Paragus compeditus* Wiedemann, 1830: 89; Peck, 1988: 81.

*Paragus aegyptius* Macquart, 1850: 464, 160.

*Paragus nitidissimus* Costa, 1878: 15.

*Paragus luteus* Brunetti, 1908: 52; Huang *et al.*, 1996: 130.

**体长** 6mm。

**雄性** 头顶三角很长, 黑色, 单眼三角前覆黄粉被, 单眼着生在头顶三角中部; 额亮黄色; 颜亮黄色, 中突很宽平; 颊极狭, 口缘黑褐色; 后头黑色, 覆淡色粉被和毛。复眼被很短的淡色毛。触角第3节很长, 顶端尖, 黄褐色, 下侧黄色; 芒短, 黄褐色。中胸背板亮黑色, 基部略覆灰粉被, 背板被淡色短毛; 侧板黑色, 中侧片密覆白粉被和同色毛; 小盾片基部黑色, 端部黄色宽。腹部细长, 椭圆形, 红黄色, 第1节基部两侧黑色, 第2节近后缘具宽的黑色横带, 第3节与第2节相似, 但横带中部不明显。足黄色, 后足腿节中部和胫节中部具暗斑, 跗节红黄色。翅透明。

**雌性** 头顶和额亮黑色, 额两侧沿眼缘覆黄粉被。腹部椭圆形, 第3-4节黑带不明显, 仅基部两侧及第2节明显黑色。

共检查 129 号标本:

北京(1951.IV.14-1973.VII.1, 3个)、山西(绛县, 1000-1300m, 1986.VII.4, 1个)、内蒙古(乌盟, 1971.VI.16-VIII.11, 2个; 锡盟, 1972.VII.25, 1个; 兴安盟 1983.VII.24, 1个)、江苏(上海, 1920.V.4-1932.VIII.30, 7个; 南京, 1918.VII.18-IX.16, 6个)、浙江(舟山, 1934.VII.20, 1个)、山东(青岛, 1个)、西藏(察雅, 3600m, 1976.VII.7, 1个)、新疆(精河, 150-600m, 1957.IX.1, 2个; 乌鲁木齐, 980m, 1955.VII.8-1959.IX.8, 5个; 巴里坤, 1955.V.20, 1个; 吐鲁番, 20-140m, 1958.V.19, 34个; 托克逊, 1958.VI.17, 2个; 天山, 1957.VIII.7, 1个; 清河, 1956.VIII.4, 1个; 尉犁, 880m, 1960.V.13, 1个; 巴楚, 1350m, 1958.IX.18, 1个; 玛纳斯, 400-550m, 1957.VIII.3, 1个; 鄯善, 22-350m, 1958.VI.20, 1个; 焉耆, 950-1170m, 1958.VII.9-VIII.26, 2个; 石河子, 590m, 1959.VIII.25, 1个;

喀什, 1400m, 1987.VI.13, 1个; 库尔勒, 1060m, 1958.VII.16-VIII.11, 5个; 阿克苏, 1210-1240m, 1958.IX.3-12, 4个; 精河, 150-6m, 1957.IX.1, 1个, 新疆部分地点从略)。

**分布** 北京、河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、山东、西藏、甘肃、新疆; 伊朗, 阿富汗; 欧洲南部, 北非。

## (62) 锯盾小蚜蝇 *Paragus crenulatus* Thomson, 1869

*Paragus crenulatus* Thomson, 1869: 503; Knutson *et al.*, 1975: 327; Peck, 1988: 81; Sun, 1987: 1178; He, 1987: 185; Li, 1989: 37-38.

**体长** 5-6mm。

**雄性** 头顶三角长, 头顶和额亮黑色, 单眼前覆黄粉被; 颜亮黄色, 中条亮褐色, 口缘黑褐色; 后头黑色, 密覆黄白色粉被和同色毛。复眼密被淡黄色短毛, 两眼短距离相接。触角第3节长, 黑褐色, 第2、3节下侧黄褐色。中胸背板亮黑色, 密被细刻点和淡色短毛; 侧板黑色, 中侧片及腹侧片上部毛白色, 长; 小盾片基半部黑色, 端半部黄色, 后缘具1排黄色锯齿。腹部第1节及第2节基部两侧黑色, 其余红黄色, 第3、4节近前缘具不明显的淡黄色粉被横带。足红黄色, 前、中足腿节基部1/3、后足腿节基部2/3为黑褐至黑色, 腿节端部及胫节基部黄色, 胫节中部具黑环, 后足跗节背面色暗。翅透明, 翅痣黄色。

**雌性** 额两侧沿眼缘覆淡黄色粉被。腹部第1节及第2节基部两侧黑色; 第2节大部红黄色, 近后缘中部具1块小黑斑; 第3节基部红黄色, 后部黑色横带宽, 黑色部分中部向前延伸近达背板前缘, 并有黑色短纵条与黑色前缘第2节黑斑相连; 第4节黑色, 中部具弓形红黄色横带, 该横带中部达背板前缘, 正中中断; 第5节与第4节相同; 第3-5节背板前缘具黄白色粉被弓形横带, 中部中断。

本种腹部和足色泽变异较大, 有的个体黑色部分不明显。

本种与东洋种 *P. serratus* (Fabricius) 的描述无明显差别, 是否两者为同物异名?

共检查73号标本:

福建(建阳, 170m, 1960.VIII.13, 1个)、广东(1932.XI.9, 2个, 1937.XI.9, 2个; 西沙, 1974.XI.25-XII.6, 4个)、广西(桂林, 1952.IX.9, 4个; 阳朔, 1938.X.16, 4个; 瑶山, 1938.V.20, 1个; 雁山, 650-1600m, 1958.VII.22-VIII.13, 9个)、海南(60-340m, 1960.III.27-VII.10, 11个)、云南(西双版纳, 650m, 1957.III.20-VIII.16, 3个, IV.23-VII.13, 9个; 大勐龙, 1958.VII.12-VIII.5, 7个, 河口, 80-120m, 1956.VI.8-11, 6个)、新疆(伊犁, 1985.X.4, 1个)。

**分布** 福建、广东、广西、海南、四川、云南、新疆; 东洋区, 澳洲区。