

喀什, 1400m, 1987.VI.13, 1 个; 库尔勒, 1060m, 1958.VII.16-VIII.11, 5 个; 阿克苏, 1210-1240m, 1958.IX.3-12, 4 个; 精河, 150-6m, 1957.IX.1, 1 个, 新疆部分地点从略)。

分布 北京、河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、山东、西藏、甘肃、新疆; 伊朗, 阿富汗; 欧洲南部, 北非。

(62) 锯盾小蚜蝇 *Paragus crenulatus* Thomson, 1869

Paragus crenulatus Thomson, 1869: 503; Knutson *et al.*, 1975: 327; Peck, 1988: 81; Sun, 1987: 1178; He, 1987: 185; Li, 1989: 37-38.

体长 5-6mm。

雄性 头顶三角长, 头顶和额亮黑色, 单眼前覆黄粉被; 颜亮黄色, 中条亮褐色, 口缘黑褐色; 后头黑色, 密覆黄白色粉被和同色毛。复眼密被淡黄色短毛, 两眼短距离相接。触角第 3 节长, 黑褐色, 第 2、3 节下侧黄褐色。中胸背板亮黑色, 密被细刻点和淡色短毛; 侧板黑色, 中侧片及腹侧片上部毛白色, 长; 小盾片基半部黑色, 端半部黄色, 后缘具 1 排黄色锯齿。腹部第 1 节及第 2 节基部两侧黑色, 其余红黄色, 第 3、4 节近前缘具不明显的淡黄色粉被横带。足红黄色, 前、中足腿节基部 1/3、后足腿节基部 2/3 为黑褐至黑色, 腿节端部及胫节基部黄色, 胫节中部具黑环, 后足跗节背面色暗。翅透明, 翅痣黄色。

雌性 额两侧沿眼缘覆淡黄色粉被。腹部第 1 节及第 2 节基部两侧黑色; 第 2 节大部红黄色, 近后缘中部具 1 块小黑斑; 第 3 节基部红黄色, 后部黑色横带宽, 黑色部分中部向前延伸近达背板前缘, 并有黑色短纵条与黑色前缘第 2 节黑斑相连; 第 4 节黑色, 中部具弓形红黄色横带, 该横带中部达背板前缘, 正中中断; 第 5 节与第 4 节相同; 第 3-5 节背板前缘具黄白色粉被弓形横带, 中部中断。

本种腹部和足色泽变异较大, 有的个体黑色部分不明显。

本种与东洋种 *P. serratus* (Fabricius) 的描述无明显差别, 是否两者为同物异名?

共检查 73 号标本:

福建(建阳, 170m, 1960.VIII.13, 1 个)、广东(1932.XI.9, 2 个, 1937.XI.9, 2 个; 西沙, 1974.XI.25-XII.6, 4 个)、广西(桂林, 1952.IX.9, 4 个; 阳朔, 1938.X.16, 4 个; 瑶山, 1938.V.20, 1 个; 雁山, 650-1600m, 1958.VII.22-VIII.13, 9 个)、海南(60-340m, 1960.III.27-VII.10, 11 个)、云南(西双版纳, 650m, 1957.III.20-VIII.16, 3 个, IV.23-VII.13, 9 个; 大勐龙, 1958.VII.12-VIII.5, 7 个, 河口, 80-120m, 1956.VI.8-11, 6 个)、新疆(伊犁, 1985.X.4, 1 个)。

分布 福建、广东、广西、海南、四川、云南、新疆; 东洋区, 澳洲区。