

缘橘红；第5节橘红色，前侧角有大黑斑；第7背板黑色，后缘中央有时具短纵脊；第8背板上同，中线处具长纵脊。(摘自 Li and Li, 1990)

分布 甘肃(古浪)。




图 51 古浪小蚜蝇 *Paragus gulangensis* Li et Li (仿 Li & Li, 1990)

a. 头 (侧面观) (head in lateral view) ♂ b. 头部 (前面观) (head in frontal view) ♂ c. 头部 (前面观) (head in frontal view) ♀ d. 第9背板 (侧面观) (epandrium in lateral view) ♂ e. 雄性下生殖板 (侧面观) (hypandrium in lateral view) ♂ f. 雄性下生殖板 (腹面观) (hypandrium in ventral view) ♂ g. 腹部末端 (侧面观) (end of abdomen in lateral view) ♀ h. 腹部末端 (背面观) (end of adomen in dorsal view) ♀

**(68) 暗红小蚜蝇 *Paragus haemorrhous* Meigen, 1822**

*Paragus haemorrhous* Meigen, 1822: 182; Peck, 1988: 78; Li, 1989: 38-39; Huang *et al.*, 1996: 131.

体长 4.0—5.5mm。

雄性 额黄色，雌性额黑色；颜中部具黑色中条。复眼淡色毛短，分布均匀。触角第3节长为宽的2倍，基部腹面棕红色，其余部分深褐色或黑色。胸部黑色。腹部第1节背板端部隆起成脊；第2背板基部比端部宽，第3背板端部比基部宽，第4背板基部比端部宽，成3个等腰梯形底顶相接；腹部黑色，部分个体第5背板暗红色。前足腿节基部2/5黑色、中部2/5黄褐色、端部1/5淡黄色，胫节基部淡黄色、端部及跗节黄褐色；中足腿节基部2/3黑色、端部1/3黄褐色至淡黄色，胫节基部2/5淡黄色，端部3/5及跗节黄褐色；后足腿节基部4/5黑色、端部1/5及胫、跗节均为黄褐色。(摘自 Li, 1989)

分布 甘肃、青海(可可西里)；欧洲，北美，非洲。