

(63) 四条小蚜蝇 *Paragus quadrifasciatus* Meigen, 1822 (图版 II: 5)

Paragus quadrifasciatus Meigen, 1822: 181; Peck, 1988: 82; He, 1992: 58; Huang *et al.*, 1996: 131.

Syrphus concinnus Wiedemann, 1822: 321.

Syrphus albifrons Wiedemann, 1822: 322.

Paragus bifasciatus Macquart, 1834: 566.

Paragus pulcherrimus Strobl, 1893: 78.

Paragus variofasciatus Becker, 1907: 249.

Paragus nohirae Matsumura, 1916: 12.

体长 5-6mm。

体稍宽。雄性 头顶三角前部黄色，单眼区黑色，具青色光泽；额全黄色；颜黄白色；复眼具白色毛，该毛排列成 2 纵条，两眼连接线约与额等长，为头顶三角长之半；触角暗褐色，第 3 节下缘棕黄色；芒黄色，端部暗褐色。中胸背板黑色，带绿色光泽，前半部具 1 对淡色粉被纵条，侧板毛银白色，细；小盾片前半部黑色，后半部黄色。腹部棕至黑色，具黄色横带；第 2 背板横带短，狭，有时中间断裂，不达背板侧缘；第 3 背板横带中间分离或不分离，两侧至背板侧缘处变宽；第 4、5 背板中间两侧各有 1 条白色粉被狭横带。足棕黄色，或前、中足腿节基部及后足腿节大部黑色。

雌性 额黑色，覆淡粉被；颜正中具暗色纵条。腹部具 4 条黄色横带，正中断裂或完整，第 4、5 背板具白色粉被横带。

共检查 160 号标本：

北京(100-500m, 1938.IX.28-1983.VIII.20, 58 个)、黑龙江(东北, 1939.VIII, 11 个；密山, 1970.VIII.25, 1 个；带岭凉水沟, 1980.VII, 1 个；绥化, 1957.VII.12, 1 个)、浙江(天目山, 1936.VII.26-1937.14, 3 个)、海南(通什, 340m, 1960.V.27, 1 个；营根, 200m, 1960.V.8, 1 个)、云南(西双版纳允景洪, 650m, 1958.VII.31, 1 个)、甘肃(1918.V.20-1934.VI.18, 20 个)、新疆(精河, 150-600m, 1957.IX.1, 1 个；乌鲁木齐, 1957.V.29, 1 个；托克逊, 76m, 1987.VI.16, 1 个；塔什库尔干, 4600m, 1987.VII.5, 1 个，新疆其他地点从略)。

分布 北京、河北、山西、东北、黑龙江、江苏、浙江、山东、河南、湖北、海南、四川、云南、西藏、甘肃、青海、新疆；原苏联，朝鲜，日本，伊朗，阿富汗；欧洲，北非。

(64) 刻点小蚜蝇 *Paragus tibialis* (Fallén, 1817) (图 50)

Pipiza tibialis Fallén, 1817: 60.