

(69) 北山小蚜蝇 *Paragus hokushankoensis* Shiraki, 1930 (图 52)

Paragus hokushankoensis Shiraki, 1930: 249-250; Knutson *et al.*, 1975: 328.

体长 3.5-5mm。

本种接近 *P. tibialis*, 区别在于: 雌性头顶和额很狭, 约 1/8 头宽; 颜约 1/5 头宽, 具很狭的红褐色中条纹, 从触角基部到口缘上方, 雄性中条纹较雌性宽。中胸背板近圆形; 侧板黄色, 无银白色毛簇; 毛较暗。腹部第 2-4 节前缘具 1 很狭的黄色毛带, 各节后缘光滑, 宽。后足胫节黑色, 基部具 1 红褐色环。(摘译自 Shiraki, 1930)

分布 台湾。




图 52 北山小蚜蝇 *Paragus hokushankoensis* Shiraki (仿 Shiraki, 1930)

a. 头 (正面观) (head in frontal view) ♂ b. 头 (正面观) (head in frontal view) ♀ c. 头 (背面观) (head in dorsal view) ♀

(70) 锯缘小蚜蝇 *Paragus serratiparamerus* Li, 1990 (图 53)

Paragus serratiparamerus Li, 1990: 45-46.

体长 5.5-6.8mm。

雄性 头顶三角区黑色，覆细密的黄色短毛和稀疏的灰白色短毛；额和颜淡黄色，被同色短毛；颜中条黄褐色，雌性颜中部具黑色条纹。复眼中区具灰白色短毛形成的两条纵带，较宽，其余部分裸露。触角第3节黄褐色，但背面和侧面黑褐色。中胸背板黑色，具金属光泽和刻点，周缘被土黄色短毛，中区毛金黄色；小盾片基部2/3黑色，端部1/3淡黄色，覆土黄色短毛；中侧片和腹侧片毛被淡黄色。腹部第1背板黑色，后缘隆起成脊，橙红色，光滑无刻点，其余部分具刻点和灰白色短毛；第2背板基部两侧黑色，后缘两侧具米粒状黑色斑块，其余部分为橙红色；第3背板橙红色，后缘黑色斑块肾形，毛的颜色及排列方式同第2背板；第4背板红褐色，后缘具两黑褐色肾形斑块；第5背板红褐色。足基节黑色；前足腿节端部1/3、中足腿节端部2/5、后足腿节端部1/4以及各足胫节基半部淡黄色，其余部分及跗节黄褐色。

雌性 腹部第2节背板黑斑楔形；第3、4背板黑斑肾形；第4、5背板均为橙红色。
(摘自 Li, 1990)

分布 新疆(玛纳斯)。

注: Stanescus (1999) 把该种作为 *Paragus oltenicus* 的同物异名种。由于我们未见标本不能确定同物异名是否成立。




图 53 锯缘小蚜蝇 *Paragus serratiparamerus* Li (仿 Li, 1990, 霍修改)

a. 头部 (侧面观) (head in lateral view) ♂ b. 头部 (背面观) (head in dorsal view) ♂ c. 外生殖器 (genitalia) d. 背针突 (背面观) (surstylus in dorsal view) e. 下生殖板 (腹面观) (hypandrium in ventral view) f. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view) ♀ g. 头部 (前面观) (head in frontal view) ♀