

分布 中国台湾。

96. 拟巢穴蚜蝇属 *Paramicrodon* de Meijere, 1913

Paramicrodon de Meijere, 1913: 360. Type species: *Paramicrodon lorentzi* de Meijere, 1913.

Syrphinella Hervé-Bazin, 1926: 73. Type species: *Syrphinella miranda* Hervé-Bazin, 1926 (mon.).

Myxogasteroides Shiraki, 1930: 9. Type species: *Myxogaster nigripennis* Sack, 1922.

属征 头球形，明显宽于背板；额狭，侧缘平行，微隆起，在触角间具 1 不明显的横窝；颜面侧缘平行；复眼裸。触角很短，两侧凹陷，第 3 节顶端圆，无窝；芒裸，与第 3 触角节等长。胸部略长于宽；小盾片几乎呈半圆形，很隆起，后缘无刺或缺刻。腹部狭，雄性呈棍棒状。翅大；肘脉在亚端室无悬脉，径横脉圆，无悬脉。腋瓣椭圆形。足适当长，无刺或齿状物，胫节顶端缩狭或后足胫节不缩狭。

本属全世界有 5 种，主要分布在我国和东南亚一带。

我国有记载而未见标本的种类：

(578) 暗翅拟巢穴蚜蝇 *Paramicrodon nigripennis* (Sack, 1922)

Myxogaster nigripennis Sack, 1922: 275.

Paramicrodon nigripennis Knutson et al., 1975: 373.

体长 10-13mm。

雄性 额宽；头后侧被稀少白毛。雌性头不大，半球形；额被褐色毛。触角及背芒褐色。后足胫节在端半部黑色。平衡棒金黄色。腹部较雄性亮些，后足胫节端部侧斑较暗，白毛不明显，短，稀疏。

雌性 头不大，半球形；腹部较雄性亮些，但足胫节端部侧斑较暗些，白毛不明显，短，稀疏。

分布 中国台湾。

(十八) 棒巴蚜蝇族 *Spheginobacchini*

族征 体中等大小；雄性两眼连线短或狭分开，雌性两眼宽分开；触角正常短；腹部收缩成柄状，足简单。翅 R_1 室开放， r_{4+5} 脉直， $r-m$ 脉位于中室中部之前。

此族为一个小类群，包括 1 属。