

角。复眼裸。小盾片小，几乎呈半圆形，无刺。腹部很狭，第4节最长。翅在亚端室具很长的悬脉，两外缘横脉几乎直，仅近边缘弯曲，角圆，无悬脉。足粗短；胫节短于腿节，略弯曲，端部加宽，后足基跗节加粗，与以下几节等长。

我国有描述的种类共1种。我们未见标本。

(577) 索那咪似膝蚜蝇 *Parocryptamus sonamii* Shiraki, 1930 (图 417)

Parocryptamus sonamii Shiraki, 1930: 12-13; Knutson *et al.*, 1975: 373.

体长 15-16mm。

头亮黑色，颜面亮暗橄榄色，被淡白色密、细毛；该毛在触角下面直，褐色；后头被稀疏但很长的黑褐毛；头的侧面覆白粉被。触角黑色，第1节等于基部2节之和，具光泽，近顶端略粗；端芒覆褐粉被，约4倍长于宽，全长几乎不明显凹入。背板略覆灰粉被和密、褐毛；肩角栗褐色；小盾片被少量褐色毛，该毛较背板毛长；胸侧片金属蓝黑色。腹部金属黑色，具紫色光泽和褐色密毛；下侧更亮些，第1-3节后缘具1宽的淡黄毛带和长毛。足几乎整个被褐毛。翅褐色，尤其在前半部褐翅脉周围，略呈雾状。(摘译自 Shiraki, 1930)




图 417 索那咪似膝蚜蝇 *Parocryptamus sonamii* Shiraki (仿 Shiraki, 1930) ♂

a. 头 (侧面观) (head in lateral view) b. 头 (背面观) (head in dorsal view) c. 头 (前面观) (head in frontal view) d. 胸、腹部 (背面观) (thorax and abdomen in dorsal view) e. 翅 (wing)

分布 中国台湾。

96. 拟巢穴蚜蝇属 *Paramicrodon* de Meijere, 1913

Paramicrodon de Meijere, 1913: 360. Type species: *Paramicrodon lorentzi* de Meijere, 1913.

Syrphinella Hervé-Bazin, 1926: 73. Type species: *Syrphinella miranda* Hervé-Bazin, 1926 (mon.).

Myxogasteroides Shiraki, 1930: 9. Type species: *Myxogaster nigripennis* Sack, 1922.

属征 头球形，明显宽于背板；额狭，侧缘平行，微隆起，在触角间具 1 不明显的横窝；颜面侧缘平行；复眼裸。触角很短，两侧凹陷，第 3 节顶端圆，无窝；芒裸，与第 3 触角节等长。胸部略长于宽；小盾片几乎呈半圆形，很隆起，后缘无刺或缺刻。腹部狭，雄性呈棍棒状。翅大；肘脉在亚端室无悬脉，径横脉圆，无悬脉。腋瓣椭圆形。足适当长，无刺或齿状物，胫节顶端缩狭或后足胫节不缩狭。

本属全世界有 5 种，主要分布在我国和东南亚一带。

我国有记载而未见标本的种类：

(578) 暗翅拟巢穴蚜蝇 *Paramicrodon nigripennis* (Sack, 1922)

Myxogaster nigripennis Sack, 1922: 275.

Paramicrodon nigripennis Knutson et al., 1975: 373.

体长 10-13mm。

雄性 额宽；头后侧被稀少白毛。雌性头不大，半球形；额被褐色毛。触角及背芒褐色。后足胫节在端半部黑色。平衡棒金黄色。腹部较雄性亮些，后足胫节端部侧斑较暗，白毛不明显，短，稀疏。

雌性 头不大，半球形；腹部较雄性亮些，但足胫节端部侧斑较暗些，白毛不明显，短，稀疏。

分布 中国台湾。

(十八) 棒巴蚜蝇族 *Spheginobacchini*

族征 体中等大小；雄性两眼连线短或狭分开，雌性两眼宽分开；触角正常短；腹部收缩成柄状，足简单。翅 R_1 室开放， r_{4+5} 脉直， $r-m$ 脉位于中室中部之前。

此族为一个小类群，包括 1 属。