

2-4 节中部具白色长毛带；腹板污黄色，被白毛。足黑色，膝部红褐色不明显；后足腿节明显加粗，近端部呈脊状加宽，为腿节的最宽处，胫节基部很弯曲，基跗节加厚；足毛大部分白色，前足和后足腿节端部毛黑色，后足胫节毛黄黑色，各足跗节腹面密被金黄色短毛。翅透明，翅痣黄褐色，翅中部具界限不明显的褐色云斑。平衡棒黄色，基部褐黑色。

雌性 额中部两侧覆三角形粉斑，额宽为头宽的 1/3。中胸背板被较短白毛。雌性腹部毛较短，刻点粗密，两侧被白毛。基跗节黄褐色。平衡棒红黄色。

共检查 3 号标本：

河北(雾灵山, 1400m, 1987.VII.17, 2 个)、东北(吉林高岭子, 1939.VII.4-10, 1 个)。

分布 河北、吉林；日本，原苏联；欧洲。

(202) 双斑缩颜蚜蝇 *Pipiza bimaculata* Meigen, 1822

Pipiza bimaculata Meigen, 1822: 246; Peck, 1988: 86.

Pipiza chalybeata Meigen, 1822: 252.

Pipiza geniculata Meigen, 1822: 245.

Pipiza guttata Meigen, 1822: 247.

Pipiza sachalinica Violovitsh, 1988: 202; Mutin, 2001: 19-20.

Neocnemodon nox Violovitsh, 1978: 202; Mutin, 2001: 19-20.

体长 7-8mm。

雄性 两复眼连线和头顶三角约等长；复眼，头顶和额被白长毛，额突毛黑色；颜两侧直，下部不加宽，密被白长毛；雌性额中部具 1 对三角形粉斑，颜宽为头宽的 2/5。触角黑色，第 3 节黑褐色，长稍大于宽，下角稍向前突出，角圆；芒短于触角，黑褐色，基半部加粗。胸部密被白色长毛和刻点。腹部黑色，第 2 节具 1 对近三角形黄色横斑，斑外侧小，内侧大，两斑明显分开，边界明显；腹部被白色长毛。足黑色，膝部、胫节末端、跗节基部 2 节黄色；后足腿节膨大，基跗节加厚。翅清晰，略呈黄色，翅痣黄褐色。平衡棒黄色。

共检查 2 号标本：

四川(道孚, 3000m, 1983.VI.12, 1 个)、新疆(阿勒泰阿祖拜, 1750m, 1960.VIII.5, 1 个)。

分布 四川、新疆；蒙古国，原苏联；欧洲。

(203) 短线缩颜蚜蝇 *Pipiza curtilinea* Cheng, Huang, Duan *et* Li, 1998 (图 144)

Pipiza curtilinea Cheng, Huang, Duan *et* Li, 1998: 421-422.