

斑，第3节斑较第2节明显；腹部毛短，黑色，混杂褐色较长毛，基部及两侧毛长；腹面黄褐色，被白色毛。足黑色，仅前、中足膝部、胫节端部、跗节基部2节不明显红褐色；后足腿节不加粗；各足腿节被较长黑毛，胫节黑褐色毛短，跗节腹面被平伏的短黄毛。翅透明，前半部略带黄褐色，翅痣黄褐色。平衡棒基部黄褐色，端部红黄色。

检查1号标本：

吉林(满洲里，1940.VI.13，1个)。

分布 吉林；蒙古国，原苏联；欧洲，新北区。




图 151 四斑缩颜蚜蝇 *Pipiza quadrimaculata* (Panzer) ♂
a. 触角 (antenna) b. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view)

(212) 单斑缩颜蚜蝇 *Pipiza unimaculata* Cheng, Huang, Duan *et* Li, 1998 (图 152)

Pipiza unimaculata Cheng, Huang, Duan *et* Li, 1998: 421.

体长 7mm。

雄性 头顶和后头被白色长毛，并混杂黑色毛；额和颜褐黑色，覆白色粉被和长毛，额突毛黑色，短；颜平直，中纵条裸，颜宽为头宽的2/5，下部略加宽。复眼被黄色毛，两复眼连线短，为头顶三角的一半高。触角黑褐色，第1、2节之和大于第3节，第3节四边形，长稍大于宽，角圆，下角向前突出；芒黑褐色，端半部褐色。中胸背板近方形，黑色，密被较粗刻点和白色长毛；小盾片半圆形，被毛同背板；侧板被白色毛，翅基部周围混杂黑色毛。腹部椭圆形，两侧几乎平行，长于头、胸之和，黑褐色；第2节背板大部分红黄色，仅侧缘和后缘红褐色；第3节红黄色斑较前者小，且不很明显，约占背板中部1/2宽；背板被白色和黑色混合毛；腹面基部黄色，中部红黄色，端部黑褐色，被毛基部白色，端部黑色。足红黑褐色，前、中足膝部、胫节端部、跗节基部2节黄色，后足跗节腹面黄色；后足腿节端半部膨大，基跗节适当加厚。翅清晰，翅脉及翅痣黄褐色。腋瓣淡黄色，平衡棒黄色。

检查1号标本：

内蒙古(索伦 (Soron), 1937.VII.20, 1 个)。

分布 内蒙古。




图 152 单斑缩颜蚜蝇 *Pipiza unimaculata* Cheng, Huang, Duan *et* Li (仿 Cheng, Huang *et* al., 1998)
a. 腹部 (背面观) (abdomen in dorsal view) b. 雄性外生殖器 (侧面观) (male genitalia in lateral view)

40. 斜额蚜蝇属 *Pipizella* Rondani, 1856

Pipizella Rondani, 1856: 54. Type species: *Mulio virens* Fabricius, 1805.

Pizopsis Matsumura, 1918: 3. Type species: *Pipiza biglumis* Matsumura, 1916.

属征 体小，黑色。触角延长；芒裸。翅透明，无斑，翅面具微毛，r-m 脉在中室基部，上外缘横脉不很斜，在中部弯曲，端部与 r_{4+5} 脉相交成直角。腹部椭圆形，无斑，雄性可见 4 节。

分布 古北区，新北区，东洋区。

我国有描述的种类共 5 种。

种 检 索 表

1. 触角很长，第 3 节长为宽的 3-4 倍 长角斜额蚜蝇 *P. antennata*
触角较短，第 3 节长不超过宽的 2.5 倍 2
2. 触角第 3 节长稍大于宽；芒基部 2/3 加粗；后足胫节毛正常；雄性外生殖器背针突侧面观成板状·3
触角中等长，第 3 节长为宽的 1.5 倍以上；芒基部不加粗；后足胫节前侧具较长瘦毛；雄外生殖器背针突侧面观细长 4
3. 腹部毛全部黄白色 蒙古斜额蚜蝇 *P. mongolorum*