

面观腹面平坦，背面拱起。翅或多或少黄色或棕色。

雌性 额较宽，覆黄灰色粉被，毛黄色，单眼三角之前毛黑色。腹部较雄性光亮，黄斑较小，近方形，第5背板黄斑明显。足色较淡，前足跗节简单。

检查5号标本：

四川(峨眉山，2100-3100m，1955.VI.25，1个)。部分标本标签写得不清楚。

分布 四川、甘肃；原苏联，蒙古国；欧洲。



图 40 凸颜宽跗蚜蝇 *Platychirus manicatus* (Meigen) (仿 Sack, 1932)
前足 (fore leg)

(44) 卵圆宽跗蚜蝇 *Platychirus ovalis* (Becker, 1921) (图 41，图版 II: 3)

Platychirus ovalis Becker, 1921: 27.

Platychirus parmatius Rondani, 1857: Synonymized by Vockeroth, 1990: 721.

Platychirus ovalis (Becker, 1921): Peck, 1988: 72; Huang *et al.*, 1996: 128.

体长 10mm。

雄性 头顶三角小，被直立长黑毛；额毛同头顶；颜略覆粉被和黑毛，中突裸，口缘突出；后头被白色淡粉被和同色毛。触角黑色，第3节下侧红黄色，长方形；芒黑色，基部粗。中胸背板黑色，具光泽，略覆淡色粉被，被黑色和淡色长毛；小盾片亮黑色，毛黑色，长，盾下毛白色，长；侧板覆白色粉被和白长毛。腹部黑色，第1节光亮，第2-5节各具1对方形红黄色侧斑，第2节斑位于背板中部，其后几对斑近背板前缘。足

黑色，腿节基部和端部、前中足胫节基部和末端及跗节基部 3 节黄色；前足跗节基部 2 节很宽阔，组成卵圆形，端部 3 节很小，后足基跗节膨大；翅透明，翅痣黄褐色。

雌性 中胸背板毛短。前、中足大部黄色，足简单。

共检查 22 号标本：

四川(德格柯洛洞, 3100m, 1983.VII.3, 1 个)、西藏(聂拉木, 3700-7900m, 1974.V.24, 4 个)、甘肃(武威天祝, 2600m, 1996.VII.14, 1 个)、新疆(乌库公路天山北坡, 2050-2600m, 1960.VI.5-9, 16 个)。

分布 四川(德格)、西藏(聂拉木)、甘肃(武威)、新疆；原苏联，蒙古国，日本；欧洲。



图 41 卵圆宽跗蚜蝇 *Platycheirus ovalis* (Becker) (仿 Sack, 1932)
前足 (fore leg)

(45) 棒胫宽跗蚜蝇 *Platycheirus sticticus* (Meigen, 1822)

Syrphus sticticus Meigen, 1822: 332.

Platycheirus spathulatus Rondani, 1857: 121.

Platycheirus sticticus (Meigen, 1822): Peck, 1988: 73.

体长 5.5-6mm。

雄性 额具金绿色光泽，后部暗黑色；颜蓝黑色，光亮，被薄粉，颜中突稍呈脊状