

圆筒形，第 2-5 节略扁，前者略短于其余跗节长度之和，均密被短毛。翅淡褐色，中部无深色斑。翅瓣淡黄白色，缨毛同色。平衡棒黄褐色。(摘自 He, 1992)

分布 上海(七宝)。

(50) 菱斑宽跗蚜蝇 *Platycheirus peltatus* (Meigen, 1822)

Syrphus peltatus Meigen, 1822: 334.

Platycheirus peltatus (Meigen, 1822): Peck, 1988: 72; Huang *et al.*, 1996: 128.

体长 10.5mm，翅长 8.5mm。

雌性 头顶及额黑亮，被黑毛；额中部两侧有白色大粉斑，有时可相连成带，此处偶杂有白毛；颜黑色，密覆黄粉，中突裸。触角黑色，第 3 节腹面橘黄色，该节呈卵圆形；芒棕黑色。中胸盾片及小盾片亮黑色，被黄色毛，两侧在肩胛后方密覆黄色粉被；盾下毛甚长而密。腹部第 1 节背板黑色，覆黄色粉被；第 2-5 节背板亮黑色，近前缘各具 1 对黄斑；第 2 节背板黄斑最大，约占该节基部的 2/3-3/4，略呈菱形，其前缘外端紧接背板前缘；第 3、4 节背板黄斑略呈梯形，分别占该节基部的 1/3 和 1/2；第 5 节背板黄斑短宽，紧接该节前缘，各黄斑上覆白色粉被，远离背板侧缘。前、中足棕黄色，腿节腹面常有黑色纵纹，胫节近端部有模糊黑斑；前足胫节端部 2/3 略粗于基部，基跗节略宽于其他跗节；后足黑色，腿节基部及膝部黄色。翅略呈灰色。(摘自 Li and Li, 1990)

分布 甘肃(天祝)。

(51) 斜斑宽跗蚜蝇 *Platycheirus scutatus* (Meigen, 1822)

Syrphus scutatus Meigen, 1822: 333.

Platycheirus scutatus (Meigen, 1822): Peck, 1988: 73; Li & Li, 1990: 36; Huang *et al.*, 1996: 128.

体长 6.5-8.5mm，翅长 6-7.5mm。

雌性 头顶和额亮黑色，被黑毛；额前半部沿眼缘有狭长的白色粉纹，额中部具 1 对小粉斑；颜覆白色粉被和白色短毛，仅中突及口缘裸。触角黑色，第 3 节腹面橘红色。中胸背板及小盾片亮黑色，被黄色毛。腹部背板主要黑色，第 2 背板端半部、第 3、4 背板基半部各具 1 对黄斑，其上覆浓密的白色粉被，黄斑内端宽而近背板前缘，外端略狭，位于背板中部，但不达该节侧缘；第 5 背板全黑色；腹部侧缘及黄斑上被白色毛，其余部分被平卧的黑色短毛。前、中足腿节黄色，有时腹面具狭长黑斑，胫节基半部黄色，端半部黑色，跗节黑色；后足主要黑色，腿节基部 1/4-1/5 及末端、胫节基部 1/4 为黄色。(摘自 Li and Li, 1990)

分布 甘肃(天祝)。