

分布 本属是个小属, 已知仅 3 种, 分布于古北、东洋两区。

我国分布有 2 种。

种 检 索 表

- 体小, r_{4+5} 脉明显弯曲凹入 R_5 室; 颜黑色, 具宽的黄色侧条……………北京首角蚜蝇 *P. beijingiensis*
 体较大, r_{4+5} 脉不明显弯曲凹入 R_5 室, 仅悬脉伸入 R_5 室; 颜黄色, 具红褐色斑……………
 ………………属模首角蚜蝇 *P. petri*

(246) 北京首角蚜蝇 *Primocerioides beijingiensis* Yang et Cheng, 1996 (图 178)

Primocerioides beijingiensis Yang et Cheng, 1996: 167-168.

体长 9mm。

雄性 头顶黑色, 单眼三角后具一块大的黄色横斑; 额黑褐色, 两侧沿眼缘具很大的黄色侧斑; 触角基部周围及颜黑褐色; 颜两侧具宽的黄色条斑, 该斑从额斑下缘直达口缘; 颊黑褐色。触角第 1 节黑褐色, 第 2 节红褐色, 第 3 节黑褐色, 覆锈色粉被; 端芒红褐色。中胸背板黑色, 密生刻点, 肩胛及盾沟两端具黄斑, 背板后缘两侧红褐色; 侧板黑褐色, 中侧片和腹侧片具 2 黄斑; 小盾片前半部具黄横带, 后半部中间黑色, 两侧红褐色。腹部黑褐色, 密具刻点; 第 1 节基部两侧各具 1 对黄斑; 第 2-4 节后缘黄色, 第 3 节黄色后缘最宽。足黑褐色, 腿节基部黄褐色, 胫、跗节红褐色。翅前半部深黄褐色。平衡棒淡黄褐色。

检查 1 号标本:

北京(公主坟, 1956.V.3, 1 个)。

分布 北京。




图 178 北京首角蚜蝇 *Primocerioides beijingiensis* Yang et Cheng

- a. 头部 (侧面观) (head in lateral view) b. 雄性外生殖器 (腹面观) (male genitalia in ventral view) c. 雄性外生殖器 (侧面观) (male genitalia in lateral view)