

雄性 额被金属光泽和黑色长毛。胫节基部暗褐色。(摘译自 Shiraki, 1930)

分布 中国台湾。

62. 拟管蚜蝇属 *Pseuderistalis* Shiraki, 1930

Pseuderistalis Shiraki, 1930: 147. Type species: *Pseuderistalis bicolor* Shiraki, 1930.

属征 头半圆形；颜中突大，额具明显额突。复眼裸，雄性接眼，雌性离眼。触角裸。中胸背板具不明显的黄色横带。腹部近末端变狭，尖。翅短，具 1 个大中斑。

分布 东洋区。

我国有描述的种类共 2 种。

(394) 黑拟管蚜蝇 *Pseuderistalis nigra* (Wiedemann, 1824) (图版 VI: 1)

Eristalis nigra Wiedemann, 1824: 38.

Pseuderistalis nigra (Wiedemann, 1824): Knutson *et al.*, 1975: 458.

头顶三角黑色，被同色毛；额黑色，被黄色毛；颜黑色，覆黄色粉被和黄色短毛。触角淡褐色，第 3 节长略大于宽；芒裸，淡褐色。中胸背板黑色，被黄色毛，具 3 条不达盾沟的亮铜绿色纵条纹；小盾片黑色，被黄色毛。腹部黑色，被黄色毛；第 1 节背板具亮铜绿色横带，第 2、3 背板具亮铜绿色斑纹，前者斑纹较宽，且两斑相隔较宽，后者斑纹较前者狭，且相距较近，第 1、2 节背板后缘均为亮铜绿色。各足腿节绝大部分黑色，后足腿节几乎全黑色；胫节基半部黄色，后半部黑褐色；跗色黑褐色；足毛淡黄色，后足腿节顶端 1/3 外下侧、胫节顶端和跗节腹面具粗黑毛。翅褐色。腋瓣黄色，缘毛同色。

检查 1 号标本：

浙江(天目山, 350-1100m, 1963.V.4, 1 个)。

本种为我国新记录种。

分布 浙江(天目山)

我国有记载而未见标本的种类：

(395) 双色拟管蚜蝇 *Pseuderistalis bicolor* Shiraki, 1930 (图 302)

Pseuderistalis bicolor Shiraki, 1930: 148-151; Knutson *et al.*, 1975: 358.

体长 14-17mm。