

*Palumbia (Korinchia) potanini* (Stackelberg, 1963): Thompson, 1957: 207; Peck, 1988: 211.

颜面除中条纹亮黑色外，覆灰白色粉被。中胸背板和小盾片毛黄色并具灰黄色鬃。腹部整个黑色，第 2-4 背板具青铜色侧斑。

分布 四川。

## 78. 伪斜环蚜蝇属 *Pterallastes* Loew, 1863

*Pterallastes* Loew, 1863: 317. Type species: *Pterallastes thoracicus* Loew, 1863 (des. Osten Sacken, 1875: 64).

*Pseudozetterstedtia* Shiraki, 1930: 199. Type species: *Pseudozetterstedtia unicolor* Shiraki, 1930.

**属征** 头前面观三角形；复眼裸，雄性合眼。额突低，位于头中部；雄性颜具平而明显的中突，雌性颜凹；颊宽。触角短，第 3 节圆；背芒裸，长。中胸背板长大于宽；小盾片无明显盾下毛；后胸腹板裸。腹部卵圆形。足简单，后足腿节不膨大，腹面具刺。翅  $R_1$  室开放， $r_{4+5}$  脉深环凹入  $R_5$  室， $r-m$  脉明显在中室中部之后。

**分布** 本属仅记载有 4 种，古北区 3 种，新北区 1 种。

我国有描述的种类共 2 种，其中 1 种有标本。

### (474) 蜂伪斜环蚜蝇 *Pterallastes bomboides* Thompson, 1974 (图版 VII: 5)

*Pterallastes bomboides* Thompson, 1974: 22; Peck, 1988: 212.

**体长** ♀ 10-11mm。

头黑色；头顶和额覆淡褐色粉被和黑色毛，额端部 1/3 黑色，光亮；颜无中突，覆灰白色粉被；后头覆灰白粉被和白毛。触角基部 2 节黄褐色，第 3 节橘黄色；芒同色。中胸背板黑色，中部密被黄色和黑色毛，盾沟处几乎全为黑色毛，两侧为粗的黄色长毛；小盾片密被粗的黄色长毛；侧板被白色至黄色长毛。腹部黑色，具光泽；第 1 节毛白色，第 2 节中部 1/3 毛黑色，短，两侧毛白色；第 3 节及其后各节毛黄红色，第 3 节两侧缘被毛白色，长。足黑色，腿节末端、胫节基部黄色，中、后足跗节橘黄色；足毛黄色至白色，仅后足腿节腹面毛黑色。翅透明。

检查 6 号标本：

四川(若尔盖，3450m，1983.VIII.31, 1 个；德格，3500m，1987.VII.5, 1 个)、西藏(察雅吉塘，3600m，1976.VII.8, 1 个；类乌齐，3750m，1976.VIII.16, 1 个)、青海(玉树布朗，3800m，1964.VIII.12, 2 个)。

分布 四川(模式产地: 康定)、西藏、青海。

我国有记载而未见标本的种类:

#### (475) 贝伪斜环蚜蝇 *Pterallastes bettyae* Thompson, 1978

*Pterallastes bettyae* Thompson, 1978: 297; Peck, 1988: 212.

**雄性** 头除头顶和后头黑色外橙色; 颜面橙色, 覆金色粉被, 中突低, 不明显; 颊橙色, 触角橙色, 覆黑色粉被, 第3节小; 芒橙色, 顶端略褐色。胸部黑色, 背板中部覆黄褐色粉被, 侧面粉被黄色, 背板毛褐色; 小盾片污黑色除顶端边缘覆一些银色粉被和茶色毛, 缘缨白色; 侧板粉被银色, 毛黄色至白色。腹部背板蓝黑色, 第1背板暗红褐色, 覆稀疏白粉被, 中部有少量黑毛, 第2背板具1钢蓝色大形三角形侧斑; 第3背板暗红褐色, 基侧角钢蓝色, 基部边缘被稀疏粉被; 第4节亮红褐色。足橙色, 基节黑褐色和前足跗节微褐色, 后足基节边缘有1排黑色鬃状毛; 前足跗节主要淡橙色, 跗节前半部黑色; 后足转节、腿节腹面1/3、胫节中部前1/3黑色; 前足胫节端部前2/3黑褐色。翅淡褐色,  $r_{4+5}$ 脉深凹入翅室顶端。腋瓣白色, 边缘和毛为橙色。(摘译自 Thompson, 1978)

分布 中国 Kwanhsien。

### 79. 短喙蚜蝇属 *Rhinotropidia* Stackelberg, 1930

*Rhinotropidia* Stackelberg, 1930: 227. Type species: *Tropidia rostrata* Shiraki, 1930 (orig. des).

*Parrhyngia* Shiraki, 1968: 205. Type species: *Parrhyngia quadrimaculata* Shiraki, 1968.

**属征** 体较小, 细长。头半球形, 略宽于胸; 颜中、下部向前突出成圆锥形短喙, 长不超过触角末端。复眼裸, 雄性复眼合生。触角小, 第3节长宽约相等, 背芒裸。小盾片具边, 后胸腹板被毛。腹部细长, 雄性逐渐收缩, 雌性椭圆形。后足腿节很膨大, 端部腹面具大的三角形齿突, 其上具刺, 后足胫节弯曲。翅  $R_1$ 室开放,  $r_{4+5}$ 脉凹入  $R_5$ 室,  $r-m$ 脉在中室中部之后。

此属为我国新记录属。

分布 古北区。

此属全世界仅记载有1种, 该种在我国有分布。

#### (476) 黄短喙蚜蝇 *Rhinotropidia rostrata* (Shiraki, 1930) (图 348)

*Tropidia rostrata* Shiraki, 1930: 90.